

Framtidsklimat i Jämtlands län

– enligt RCP-scenarier

Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén
Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist



Pärmbilden visar den lokala medeltillrinningen vid slutet av seklet enligt RCP8.5.

KLIMATOLOGI Nr 34, 2015

Framtidsklimat i Jämtlands län

– enligt RCP-scenarier

Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén
Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist

Sammanfattning

Hur klimatet i Jämtlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jämtland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Geografiskt detaljerade klimatdata har tagits fram och använts för hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av modelldata.

Temperaturen i Jämtlands län beräknas öka med ca 3 grader enligt RCP4.5 och ca 5 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid med dryga 5 grader enligt RCP8.5. Vegetationsperiodens längd ökar med ca 30-50 dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 8 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 %. Nederbörden ökar mest vintertid, i östra delen av länet visar RCP8.5 på 40 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15- 20% beroende på RCP-scenario.

För länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot 10 % vid mitten av seklet. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet för både RCP 4.5 och RCP 8.5 ökningen är relativt jämnt fördelad över länet. Den procentuellt största ökningen sker vintertid.

Tillrinning med återkomsttid 10 år respektive 100 år ser ut att öka i de sydvästliga delarna av länet, i övriga delar av länet är tillrinningen oförändrad eller minskande. Dammån och Ljusnan uppvisar ökande 100-årstillrinning.

För Faxälven, Indalälven och Ljusnan kvarstår årstidsförloppet men vårflödestoppen kommer tidigare. Vårflödena blir både kraftigare och mindre kraftiga beroende på område och scenario. Under hösten och vintern blir flödena högre men sommaren påverkas inte nämnvärt.

Antalet dagar med snö varierar något över länet. Enligt klimatscenarierna minskar snötäcket generellt i länet men främst i den östra delen. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 8-10 dagar till 25-45 dagar mot slutet av seklet.

Summary

The report describes today's and future climate in Jämtland County based on observations and climate modelling. Regional modelled RCP4.5 and RCP8.5 scenarios have been further downscaled to 4×4 km² resolution. The results are presented as meteorological and hydrological indices based on statistically processed model data.

Ordlista

Avrinningsområde	Det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid en angiven plats.
DBS-metoden	"Distribution Based Scaling" är ett verktyg för att korrigera klimatmodellernas utdata så att de kan användas som indata till hydrologisk modellering. Med DBS-skalering fås en högre rumslig upplösning av data.
Flöde	Här avses vattenflöde dvs. hur mycket vatten som rinner i vattendragen.
Global klimatmodell (GCM)	På engelska "Global Circulation Model" eller "Global Climate Model". En global klimatmodell beskriver hela jordklotet och de processer som sker i atmosfären, havet, havsisen och marken.
Gridbox	I en klimatmodell delas atmosfären upp i tredimensionella lådor, så kallade gridboxar. I varje gridbox räknas alla klimatologiska variabler ut som beskriver klimatet i den boxen.
HBV	En hydrologisk modell som beräknar markfuktighet, snöackumulation, snösmältning, avdunstning och avrinning/tillrinning samt beskriver vattnets väg i avrinningsområdet.
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change. Även benämnd FN:s klimatpanel.
Klimatindex	Bearbetade utdata från klimatmodeller. De kan beskriva medelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden.
Klimatscenario	En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser, en global och en regional klimatmodell.
Osäkerhet	Det finns olika källor till osäkerheter i frågan om framtidens klimat. Den största osäkerheten ligger i hur mycket växthusgaser människan kommer släppa ut i framtiden. Det finns även osäkerheter i klimatmodellerna, t.ex. beroende på begränsad upplösning i både tid och rum.
RCA	Rosby Centre Regional Climate model (RCA) är en regional klimatmodell som utvecklas och används av SMHI:s klimatforskningsgrupp.
RCP	RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet "representativa koncentrationsutvecklingsbanor" från engelskans "Representative Concentration Pathways (RCP)". RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i W/m^2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013.
Referensperiod	SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att definiera dagens klimat. Nya observationer jämförs med medelvärdet för 1961-1990 för att säga hur de avviker från det normala. Meteorologiska världsorganisationen, WMO, definierar referensperioderna och nästa period blir 1991-2020.
Regional klimatmodell (RCM)	Beskriver klimatet för en del av jordklotet, en region. En regional klimatmodell använder alltid indata från en global klimatmodell.
SRES	Scenarier som beskriver framtida utsläpp av växthusgaser, baserade på antaganden om den framtida utvecklingen av världen. SRES-scenarier användes i de beräkningar av

	framtidens klimat som låg till grund för arbetet med IPCC:s rapporter från år 2000 och 2007. SRES= Special Report on Emission Scenarios.
Strålningsdrivning	Strålningsdrivningen är skillnaden mellan hur mycket energi solstrålningen som träffar jorden innehåller och hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden igen. Denna energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m ² . Strålningsdrivningen ökar då mängden växthusgaser ökar i atmosfären, vilket resulterar i en global ökning av temperaturen på jorden. För att studera framtida klimat finns ett antal strålningsdrivningsscenarier att utgå ifrån, se "RCP".
Trend	Här används begreppet som "en förändring över tid".
Upplösning	Upplösningen är storleken på gridboxarna i klimatmodellen. Låg upplösning (stora gridboxar) ger mindre detaljerad information, men kostar mindre datorkraft. Hög upplösning (små gridboxar) ger mer detaljerad information, men kostar mer datorkraft.
Variabilitet	Variabilitet är en viktig faktor inom klimatologin. Klimatet är inte bara genomsnittliga värden utan klimat kännetecknas av variationer i tid och rum som kan hänga ihop med till exempel växelverkan mellan atmosfären och havet.
Växthusgaser	Atmosfären som omger jorden har förmågan att bevara energin från solen så att jordytan blir varmare än vad den skulle varit om atmosfären inte fanns. Den s.k. naturliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av en viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären. Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna. Atmosfärens sammansättning har sedan den förindustriella tiden successivt förändrats på grund av mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon, men även en rad industrigaser spelar roll.
Återkomsttid	Ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Ett värde som har en återkomsttid på 100 år uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år. Det innebär att sannolikheten är en (1) procent varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större. För en konstruktion vars livslängd beräknas till 100 år blir den ackumulerade risken hela 63 % att 100-årsvärdet överskrids någon gång under 100 år. Om säkerhetsnivån väljs till 100-årsvärdet är risken att det värdet överskrids större än att det underskrids. Det är alltså troligare att konstruktionen, under sin livslängd, kommer att utsättas för förhållanden utöver den nivå som valts än att den nivån aldrig inträffar. För 10-årsvärdet är sannolikheten 65 % att det överskrids någon gång under 10 år.

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	1
2	BAKGRUND	1
3	METOD OCH PRESENTATION	1
3.1	Antaganden, modeller och databearbetning.....	1
3.2	Osäkerheter	2
3.3	Generella resultat för Sverige	3
3.4	Jämförelse SRES-RCP.....	3
3.5	Läsanvisningar.....	5
3.5.1	Kartor	5
3.5.2	Diagram	5
4	TEMPERATUR	7
4.1	Årsmedeltemperatur	7
4.2	Medeltemperatur vinter.....	9
4.3	Medeltemperatur vår	11
4.4	Medeltemperatur sommar	13
4.5	Medeltemperatur höst.....	15
4.6	Vegetationsperiodens längd	17
4.7	Vegetationsperiodens starttidpunkt	19
4.8	Värmebölja.....	21
5	NEDERBÖRD.....	23
5.1	Årsmedelnederbörd	23
5.2	Medelnederbörd vinter.....	25
5.3	Medelnederbörd vår	27
5.4	Medelnederbörd sommar	29
5.5	Medelnederbörd höst.....	31
5.6	Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd.....	33
5.7	Maximal dygnsnederbörd.....	35
5.8	Förändring av korttidsnederbörd.....	37
6	TOTAL MEDELTILLRINNING	38
6.1	Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger.....	39
6.2	Förändrad total 10-årstillrinning	50
6.3	Förändrad total 100-årstillrinning	53
7	LOKAL MEDELTILLRINNING.....	56
7.1	Förändrad lokal årsmedeltillrinning.....	56

7.2	Förändrad lokal medeltillrinning vinter	58
7.3	Förändrad lokal medeltillrinning vår.....	59
7.4	Förändrad lokal medeltillrinning sommar	60
7.5	Förändrad lokal medeltillrinning höst	61
7.6	Förändrad lokal 10-årstillrinning.....	62
7.7	Förändrad lokal 100-årstillrinning.....	63
8	TILLRINNINGENS ÅRSDYNAMIK	64
9	SNÖ	67
9.1	Antal dagar med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll	67
9.2	Antal dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll	69
9.3	Förändrat maximalt snötäcke.....	71
10	MARKFUKTIGHET	72
11	SLUTSATSER	74
12	TACKORD	74
13	REFERENSER	75

1 Inledning

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jämtland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av data.

2 Bakgrund

FN:s klimatpanel presenterade 2013 en ny rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013). Resultaten baserades på nya möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). SMHI fick 2014 i uppdrag av regeringen att göra en enhetlig studie för Sverige baserad på dessa scenarier. Studien finansierades via det klimatanpassningsanslag som tilldelades Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Arbetet resulterade i databasen SCID med statistik i form av klimatindex för Sveriges nutida och framtida klimat. Databasen, tillsammans med en rapport och beskrivande dokument, finns tillgänglig som en nedladdningstjänst på smhi.se. Rapporten "Klimatscenarier för Sverige" beskriver metoder, resultat och osäkerheter, vilket är viktigt att ha kunskaper om vid studier av framtida klimat på läns- och kommunnivå (Sjökvist m.fl., 2015).

I regleringsbrevet för 2015 avseende klimatanpassningsanslaget gavs SMHI i uppdrag att ta fram länsvisa enhetliga klimatanalyser baserade på de nya klimatscenierna. Den ovan nämnda databasen är utgångspunkten för analyserna i föreliggande rapport som avser Jämtlands län.

SMHI har tidigare levererat en klimatanalys på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtland (Persson m.fl., 2013). Den baseras på äldre klimatscenarier och behandlar framtida temperatur, nederbörd vattenföring och snö. Rapporten innehåller också en beskrivning av Jämtlands nutidsklimat och kunskapsläget för framtida förändringar av tjäle, brandrisk. Det har också tidigare gjorts en rapport som beskriver framtida klimatet i fjällkedjan (Eklund m.fl., 2011.).

3 Metod och presentation

I detta kapitel beskrivs metodiken mycket kortfattat. Mer information finns i rapporten "Klimatscenarier för Sverige" som nämns ovan. På smhi.se finns också en "Vägledning klimatscenarier" som stöd för användande av klimatscenarier (Persson m.fl., 2015). I Ordlistan finns flertalet begrepp definierade.

3.1 Antaganden, modeller och databearbetning

Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser förändras. För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som slår in beror på människans förmåga att begränsa utsläppen. RCP-scenarierna beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till år 2100. I följande analyser används två RCP-scenarier, RCP4.5 som bygger på begränsade utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp. Tabell 1 beskriver vilka antaganden som ligger till grund för scenarierna.

Forskarvärlden har fokuserat på dessa två scenarier, därför finns det mest fullständiga underlaget för dessa i form av regionala klimatberäkningar. Det är skälet till att dessa två scenarier använts i föreliggande rapport. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd vad avser framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.


Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för scenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

RCP4.5	RCP8.5
• Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring år 2040 • Befolkningsmängd något under 9 miljarder i slutet av seklet • Lågt arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster • Omfattande skogsplanteringsprogram • Låg energiintensitet • Kraftfull klimatpolitik	• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar kraftigt • Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion • Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt • Stort beroende av fossila bränslen • Hög energiintensitet • Ingen tillkommande klimatpolitik

För att göra beräkningar av det framtida klimatet krävs klimatmodeller, de är matematiskt formulerade beskrivningar av de fysikaliska processerna i klimatsystemet. De globala klimatmodellerna beskriver hela jorden och de regionala beskriver mer förfinat ett delområde. Indelningen sker i så kallade gridboxar, ett 3-dimensionellt rutnät av atmosfären. Det är mycket omfattande beräkningar som sker på superdatorer.

Den globala klimatmodelleringen görs med en relativt grov upplösning, vilket betyder att storleken på rutorna vid jordytan kan vara ca $200 \times 200 \text{ km}^2$. Den regionala klimatmodelleringen utförs med högre upplösning, ca $50 \times 50 \text{ km}^2$, och ger därför mer detaljerade beräkningar. I analysen ingår nio olika globala klimatmodeller från olika institut runt om i världen. Rossby Centre vid SMHI har utfört regional modellering med den regionala klimatmodellen RCA4.

För att utföra analyser på lokal skala, exempelvis för hydrologiska beräkningar, krävs data med ännu högre geografisk upplösning. SMHI har därför utvecklat en metod, DBS (Distribution Based Scaling), för att öka upplösningen till $4 \times 4 \text{ km}^2$. Därefter har hydrologisk modellering utförts med HBV-modellen. Flödesberäkningar baseras på oreglerade förhållanden.



Statistik har beräknats i form av klimatindex, vilka är definierade i respektive avsnitt. Varje enskilt modellresultat har bearbetats separat men resultaten presenteras sammanlagda för RCP4.5 och RCP8.5. De index som berör temperatur och nederbörd, presenteras med $4 \times 4 \text{ km}^2$ upplösning. De hydrologiska indexen, som berör tillrinning, snö och markfuktighet, presenteras för avrinningsområden. Beräkningar av korttidsnederbörd (avsnitt 5.8) är utförd direkt på regional klimatdata.

3.2 Osäkerheter

Ett klimatscenario kräver en lång kedja av beräkningar och antaganden. Det finns alltså flera källor till osäkerheter; klimatets naturliga variationer, val av klimatmodell och framtida utsläpp av växthusgaser.

Den naturliga variationen innebär att klimatet varierar naturligt från år till år. Denna osäkerhet påverkar mest klimatscenarier för en nära framtid, eftersom klimatet inte hunnit förändras så mycket. Klimatförändringen är då svår att urskilja från den naturliga variationen i klimatet.

Alla klimatmodeller baseras på samma grundläggande kunskap om klimatsystemet och fungerar på ungefär samma sätt. Resultaten skiljer sig ändå åt beroende på att processerna i klimatsystemet kan beskrivas på olika sätt, och att fler eller färre processer inkluderas i modellerna. Ingen modell är perfekt, därför är det bra att sammanväga resultaten från olika modeller. Det ger ett mått på hur stor betydelse olika modellbeskrivningar har för det beräknade klimatet.

Framtidens klimat beror på framtida utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt resultat, som kan utläsas i klimatscenarierna, är att valet av RCP-scenario har mycket liten betydelse för de närmsta årtiondena. Mot mitten på seklet börjar valet av RCP-scenario växa i betydelse för klimatets utveckling.

3.3 Generella resultat för Sverige

I figur 1 och 2 visas översiktliga beräkningar av framtidens förändringar av temperatur och nederbörd i Sverige. Där redovisas även tidigare resultat baserade på s.k. SRES-scenarier. Skillnaderna kommenteras mer utförligt i kapitel 3.4.

Årsmedeltemperaturen beräknas öka för hela Sverige i framtiden. RCP8.5 visar generellt på störst uppvärmning (4-6 grader). RCP4.5 visar på samma mönster men en lägre uppvärmning (2-4 grader).

Nederbörden beräknas öka i framtiden. RCP8.5 visar störst förändring, särskilt i norra Sverige, där ökningen beräknats till 30-50 %. RCP4.5 visar samma förändringsmönster, men som mest 30 % ökning (i Lapplandsfjällen).

Medeltillrinningen väntas öka i hela landet utom i sydöstra Sverige, där det sker en minskning. Störst ökning sker i landets norra delar. RCP8.5 ger det mest extrema resultatet både där tillrinningen ökar och där den minskar.


Extrema vattenflöden, redovisade som 100-årsflöden¹, beräknas öka i vattendragen i södra Sverige mot slutet av seklet. I de nordliga älvarna är förändringen mindre tydlig och kan till och med medföra en minskning av de extrema flödena.

3.4 Jämförelse SRES-RCP


Klimatforskningen utvecklas hela tiden, nya resultat publiceras, liksom nya sätt att beskriva antaganden om framtida utsläpp. I FN:s klimatpanels tredje och fjärde stora sammanställning (IPCC, 2001 och IPCC, 2007) användes scenarierna SRES (Special Report on Emission Scenarios) (Nakićenović and Swart (eds.) 2000). I femte sammanställningen AR5 (IPCC, 2013) antogs de nya scenarierna RCP (Representative Concentration Pathways) (ICONICS, 2013).

I de tidigare länsanalyser som utförts av SMHI baseras resultaten på 16 SRES-scenarier med tyngdpunkt på utsläppsscenario A1B. För att få en uppfattning om hur dessa skiljer sig från de nya RCP-scenarierna visas här kartor på förändringen i temperatur för perioden 2069-2098 jämfört med 1961-1990 (Figur 1).

Alla scenarier visar på en tydlig uppvärmning i hela landet och störst uppvärmning i norra Sverige. SRES-scenarierna har inte lika tydlig gradient mellan norra och södra Sverige som RCP-scenarierna. Uppvärmningen är generellt något lägre än i RCP8.5, men utmärkande för SRES-scenarierna är hög uppvärmning längs kusterna, framförallt norra Norrlandskusten. Det beror med stor sannolikhet på dataunderlaget till SRES-analysen, då temperaturdata längs kusten påverkades mycket av havsklimatet, vilket kan ge missvisande resultat. De höga värdena längs kusterna i SRES-kartan bör alltså tolkas med försiktighet.



Figur 1. Beräknad förändring av årsmedeltemperatur för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.



Figur 2. Beräknad procentuell förändring av årsnederbörden för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.

Kartorna i figur 2 visar förändringen i årsmedelnederbörd vid slutet på seklet jämfört med perioden 1961-1990. SRES-scenarierna är mycket lika RCP4.5, med en ökning på 10-30 %.

Skillnaderna är alltså olika beroende på vilken variabel som studeras och beror till stora delar på de klimatmodeller som använts i beräkningarna. För SRES-analyserna användes 16 olika uppsättningar av globala och regionala modeller, medan RCP-analyserna är baserade på nio olika globala modeller och en regional (RCA4). Det ger en bättre representation avseende globala beräkningar men i analysen har endast data från en regional modell varit tillgänglig, vilket kan ge ett snävt resultat. RCA4 har visat sig vara något blötare i jämförelse med andra regionala modeller, vilket betyder att samma RCP-scenarier kan uppvisa något torrare klimatförändring med andra kombinationer av globala och regionala modeller.

3.5 Läsanvisningar

På följande sidor presenteras index baserade på temperatur, nederbörd, tillrinning, snö och markfuktighet. Indexen beskrivs och resultaten presenteras i korta texter i respektive kapitel. Indexen presenteras lite olika vad gäller kartor och diagram, vilket beskrivs nedan.

3.5.1 Kartor

För temperatur- och nederbördsindex, antal dagar med snötäcke samt markfuktighet visas observerade och beräknade värden. För medeltemperatur och medelnederbörd samt antal dagar med mer än 10 mm nederbörd visas även kartor över förändringar mellan tidsperioder.

För index baserade på tillrinning samt maximalt snötäcke presenteras endast förändringar mellan tidsperioder. Förändringar anges som procentuell avvikelse från referensperioden.

Alla kartor visar medelvärden över en given tidsperiod. I de kartor som visar förändringar mellan tidsperioder är värdena geografiskt utjämnade för att underlätta tolkningen.

Sverigekartorna representerar respektive index för referensperioden 1961-1990 och visar hur förhållandena i länet relaterar till övriga Sverige.

Kartorna innehåller punkter som markerar länets huvudorter. Ortnamnen är utskrivna i Figur 5 i avsnitt 6.


3.5.2 Diagram

Diagrammen för temperatur och nederbörd visar utvecklingen över tid för länet som helhet jämfört med referensperioden 1961-1990. Tillrinning, snö och markfuktighet är beräknade utifrån hydrologisk modellering och diagrammen för de indexen visar utvecklingen över tid för ett definierat avrinningsområde, jämfört med referensperioden 1963-1992.

Diagram för temperatur och nederbörd innehåller staplar med observationer som är geografiska medelvärden för hela länet, se förklaring av diagrammets uppbyggnad i figur 3. För tillrinning, snö och markfuktighet finns inte motsvarande observerade värden att tillgå, därför saknar de diagrammen observationsstaplar.

Tillrinningens årsdynamik presenteras som 30-årsmedelvärden för referensperioden 1963-1992 och framtidsperioden 2069-2098.

Diagrammen över förändring av korttidsnederbörd avser länet som helhet.




Figur 3. Beskrivning av diagrammens struktur i rapporten.

4 Temperatur


4.1 Årsmedeltemperatur

Observerat 1961-1990


Årsmedeltemperatur är medelvärdet av varje års medeltemperatur beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur. Det är tillsammans med årsmedelnederbörd det mest använda indexet för att beskriva klimatet.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Temperatur (°C)



RCP4.5

RCP8.5






Under perioden 1961-1990 var årsmedeltemperaturen för hela Jämtlands län 1,0°C. Årsmedeltemperaturen varierar dock något i länet, i fjällen ca 0°C, men i lågterrängen i öster upp mot 1,5 °C. Under början av 2000-talet blev det bara en marginell ökning i länet, men trenden att det blir varmare är tydlig i båda klimatscenarierna. I mitten av seklet, perioden 2021-2050, är resultaten från de båda RCP-scenarierna mycket lika, skillnaderna tydliggörs först under andra hälften av seklet.

I diagrammet visas förändringen över länet som helhet för de två RCP-scenarierna, årsvärden av observerad medeltemperatur för Jämtland är markerade som staplar. Staplarna visar att årsmedeltemperaturen för länet som helhet kan variera med ca 2°C. Denna mellanårsvariation består även i framtiden, vilket framgår av de skuggade fälten i diagrammet. De heldragna linjerna visar 30-års löpande medelvärde av scenarierna för att förtydliga trender. Temperaturen väntas stiga med flera grader till slutet av seklet; enligt RCP4.5 med 3 grader medan RCP8.5 visar på en 5-gradig ökning.


4.2 Medeltemperatur vinter

Observerat 1961-1990


Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärden för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Temperatur (°C)






RCP4.5

RCP8.5



Förändring (°C)

Förändring
2069-2098 vs 1961-1990


RCP4.5**RCP8.5**

Jämtlands vintermedeltemperatur var under referensperioden 1961-1990 -9,2°C. Vintrarna har blivit något mildare i länet under de senaste 23 åren, men staplarna i diagrammet visar att mellanårsvariationen är stor. De två olika scenarierna visar samstämmigt på att det blir mildare vintrar framöver. Enligt RCP4.5 blir det drygt 3 grader varmare till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar drygt 5 graders skillnad mot referensperioden 1961-1990. Temperaturökningen är något större i den östra mer låglänta delen av länet.


4.3 Medeltemperatur vår

Observerat 1961-1990


Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Temperatur (°C)



RCP4.5

RCP8.5






Medeltemperaturen för våren under perioden 1961-1990 var 0,2 °C, och mellanårsvariationen är betydligt mindre jämfört med vintern. De senaste drygt 20 åren har medeltemperaturen ökat med någon grad och trenden håller i sig under resten av århundradet. Temperaturökningen är relativt jämnt fördelad över länet. Enligt RCP4.5 blir det 2-3 graders temperaturökning medan RCP8.5 visar på uppemot 5 graders ökning jämfört med 1961-1990.


4.4 Medeltemperatur sommar

Observerat 1961-1990


Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Temperatur (°C)



RCP4.5

RCP8.5






Sommarmedeltemperaturen under 1961-1990 var 11,3 °C. Sommarmedeltemperaturen är relativt jämnt fördelad över länet, i de östra delarna av Jämtland låg temperaturen på runt 12°C i medeltal under referensperioden och steg något under perioden 1991-2013. I fjällen är sommarmedeltemperaturen något lägre, runt 10°C under referensperioden. Temperaturen fortsätter att stiga och i slutet på seklet visar båda RCP-scenarierna att medeltemperaturen kommer ligga på 14-16°C. Enligt RCP4.5 stiger temperaturen med 2-3 grader, medan RCP8.5 visar på en dryga 5-gradig temperaturökning. Temperaturökningen är störst i Jämtlandsfjällen.


4.5 Medeltemperatur höst

Observerat 1961-1990

Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Temperatur (°C)



RCP4.5

RCP8.5





Medeltemperaturen för hösten låg på 1,4°C under 1961- 1990 för att stiga någon grad under perioden 1991 och 2013. I lågtterräng var höstens medeltemperatur ca 2°C och under de senaste drygt 20 åren har det blivit lite mildare. Trenden med mildare höst håller i sig och fram till slutet av seklet har det blivit 3-5 grader varmare i hela länet. Ökningen är relativt jämnt fördelad över hela länet.


Allmänt om årstiderna

Både RCP4.5 och RCP8.5 visar på en temperaturökning för alla årstiderna fram till slutet av seklet. Temperaturökningen kan indikera, om medeltemperaturer används för att definiera årstiderna, att hösten håller i sig längre och att våren kommer tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare och sommaren längre.

Temperaturökningen för alla säsonger är relativt sammstämmig. Enligt RCP4.5 blir det drygt 3 grader varmare till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar på drygt 5 graders ökning jämfört med referensperioden 1961-1990. Temperaturökningen är relativt jämnt fördelad över länet.


4.6 Vegetationsperiodens längd

Observerat 1961-1990




Längden på vegetationsperioden är definierad som skillnaden mellan sluttidpunkt och starttidpunkt. Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning.


Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Antal dagar



RCP4.5

RCP8.5






Längden på vegetationsperioden¹ under perioden 1961-1990 för länet som helhet var 145 dagar. I Jämtlandsfjällen är vegetationsperioden kortare än 134 dagar och i låglandet ligger vegetationsperioden på i genomsnitt 5 månader. Under de senaste dryga 20 åren har vegetationsperioden ökat med ungefär 1 vecka i stora delar av länet.

Klimatscenerierna visar tydligt att vegetationsperioden kan bli längre under de kommande årtiondena. Den största ökningen ses för de östra delarna av länet. Fram mot slutet av århundrandet visar RCP4.5 på en ökning med generellt 3-4 veckor över hela länet. Temperaturen i scenario RCP8.5 är lite varmare än RCP4.5 under våren och hösten och detta syns tydligt på vegetationsperioden. Mellan de två scenarierna skiljer det ungefär 2-3 veckor.

¹ Vegetationsperioden definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett visst gränsvärde, som varierar för olika tillämpningar men ligger vanligen mellan +3°C och +5°C. Vegetationsperiod benämns ibland växtsäsong.


4.7 Vegetationsperiodens starttidpunkt

Observerat 1961-1990




Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Indexet baseras enbart på beräkningar med temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. Indexet ger tillsammans med vegetationsperiodens längd en uppfattning om framtida förhållanden för sådd och skördetidpunkter.


Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Dagnummer



RCP4.5

RCP8.5






Vegetationsperiodens start definieras här som första tillfället på året när dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C under 4 dagar i följd. Vegetationsperiodens start räknas då från den första av dessa fyra dagar. Starttiden kan variera en del från år till år, beroende på om vintern varit lång och kall eller om mildluft tidigt förs in. Under referensperioden 1961-1990 hamnar medelvärde för starttiden för vegetationen på dagnummer 130, vilket motsvarar början på april. Under 90-talet och 2000-talet tidigare lades vegetationsperiodens start allmänt med någon dag. Trenden håller i sig under resten utav århundradet. I slutet av seklet har starttidpunkten tidigare lagts med ca 2 veckor enligt RCP4.5 medan RCP8.5 visar på ca 3 veckor.

Analyserna av vegetationsperiodens start och längd visar att vegetationsperiodens slut förändras ungefär lika mycket som starttidpunkten. I slutet av seklet senareläggs sluttidpunkten med ca 2 veckor enligt RCP4.5 och ca 1 månad enligt RCP 8.5.


4.8 Värmebölja

Observerat 1961-1990




Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner. Här definieras värmebölja som årets längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20°C. Indexet belyser behovet av anpassning till perioder med höga temperaturer för t.ex. byggnader och vård- och omsorgssektorn.


Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Antal dagar



RCP4.5

RCP8.5






Under perioden 1961-1990 var det bara ett fåtal tillfällen varje år som dygnsmedeltemperaturen kom över 20°C. Medelvärde för länet som helhet var 0,7 dagar. Det har under de senaste drygt 20 åren blivit något varmare men antalet sammanhängande dagar med medeltemperaturer över 20°C har bara ökat med ca 1 dag per år i länet. Under de kommande åren visar beräkningarna på längre perioder med dygnsmedeltemperaturer över 20°C. Skillnaden är störst för RCP8.5, i vilket värmeböljornas längd har ökat med 6-7 dagar i slutet av seklet. I fjällen rör det sig i genomsnitt om 5 dagar i följd och i de östra delarna kan det röra sig om 8-9 dagar i följd med värmebölja. Ökningen är inte fullt lika stor i RCP4.5, 3-4 dagar för hela länet.

5 Nederbörd


5.1 Årsmedelnederbörd

Observerat 1961-1990


Årsmedelnederbörd är medelvärdet av varje års summerade dygnsnederbörd. Det är tillsammans med årsmedeltemperatur det mest använda klimatindexet för att beskriva klimatet.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Årsmedelnederbörden i Jämtland var under perioden 1961-1990 746 mm. Det regnar och snöar mest i den västra delen av länet, eftersom länet är mest höglänt där och våra vädersystem vanligen kommer västerifrån. Diagrammet visar att mellanårsvariationen är stor (se de svarta observationsstaplarna). Under de senaste 23 åren har nederbörden ökat något, främst i länets västra del. I ett framtida klimat väntas nederbörden öka, vilket båda RCP-scenarierna visar. Ökningen är störst i RCP8.5, drygt 30 % till slutet av seklet, medan RCP4.5 har en ökning på ca 20 %. Förändringskartorna visar att ökningen är störst i mellersta delen av länet.


5.2 Medelnederbörd vinter

Observerat 1961-1990


Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Vinternederbörden i Jämtland faller mestadels som snö och de största mängderna faller i de västra delarna av länet. Årsmedelvärdet för hela länet i smält form var under perioden 1961-1990 162 mm. I Jämtlandsfjällen är medelvärdet 220 mm under vintermånaderna medan det i den mer låglänta terrängen i genomsnitt faller 125 mm. Diagrammet visar att mellanårsvariationen är mycket stor, skillnader på 50 % från år till år är inte ovanlig. Liksom årsmedelnederbörden har vinternederbörden ökat de senaste 23 åren. RCP8.5 visar på störst ökning till slutet av seklet, drygt 40 %, och ökningen är störst länets östra delar. RCP4.5 visar på ungefär hälften så stor ökning till slutet av seklet. I och med ett varmare klimat kommer nederbörd som regn i stället för snö att bli allt vanligare vintertid.


5.3 Medelnederbörd vår

Observerat 1961-1990


Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Vårnederbörden är jämnt fördelad över länet och summeras till 130 mm för perioden 1961-1990, men mellanårsvariationen är stor. I slutet av seklet väntas en ökning av vårnederbörden med dryga 20 % enligt RCP4.5 och upp mot 50 % enligt RCP8.5.


5.4 Medelnederbörd sommar

Observerat 1961-1990


Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Sommaren är årstiden med störst nederbördsmängder i Jämtland, i genomsnitt 235 mm under perioden 1961-1990. Mellanårsvariationen är inte lika stor som för de andra årstiderna, men några ovanligt blöta år inträffade i början av 2000-talet, vilket syns både i diagram och karta. Enligt klimatscenarierna sker en svag ökning av sommarnederbörden fram till slutet av seklet på mellan 15 och 25 %. Ökningen är något större i RCP8.5, men de två scenarierna är mycket lika.


5.5 Medelnederbörd höst

Observerat 1961-1990


Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Höstnederbörden i Jämtland är i medeltal 208 mm för referensperioden 1961-1990 och mellanårsvariationen är stor. Till mitten av seklet ger de båda RCP-scenarierna mycket lika resultat, en ökning på ca 10 % väntas. RCP 4.5 visar liten förändring till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar en ökning på ca 30 %. Störst ökning sker i mellersta delen av länet.


5.6 Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd

Observerat 1961-1990


Kartorna visar medelvärdet av varje års totala antal dagar då nederbörden överstiger 10 mm. Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder och kan till exempel användas vid dimensionering av dagvattensystem.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar






RCP4.5

RCP8.5



Antal dagar




Under referensperioden 1961-1990 uppmättes mer än 10 mm nederbörd på ett dygn i genomsnitt 16 gånger på ett år. Jämtland väntas få fler sådana tillfällen i framtiden, enligt RCP4.5 ökar antalet dagar med ca 7 och enligt RCP8.5 med ca 11. Ökningen är störst i Jämtlandsfjällen.


5.7 Maximal dygnsnederbörd

Observerat 1961-1990


Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd. Resultaten presenteras som medelvärden över angiven period. Indexet kan till exempel användas i dagvattenplanering och skyfallskarteringar.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Det geografiska medelvärde av årets största dygnsnederbörd för perioden 1961-1990 är 29 mm, men enligt diagrammet varierar mängden mycket från år till år. Ett enskilt regn kan ge betydligt större regnmängder. Scenarierna visar på en tydlig ökning av dygnsnederbörden, RCP8.5 ger en ökning på 20 % till slutet av seklet. RCP4.5 visar på något mindre förändring. Den geografiska förekomsten av maximal dygnsnederbörd är oregelbunden, vilket betyder att ett kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst i länet.

5.8 Förändring av korttidsnederbörd

I föregående avsnitt har nederbörd analyserats utifrån dygnsvärden, både på års-, säsongs- och dygnsbasis. SMHI har även gjort studier av hur intensiv nederbörd kan förändras i framtiden.

Som underlag till Dricksvattenutredningen publicerades en rapport som bland annat innehåller kartor på Sverigeskala över så kallad framtida extrem korttidsnederbörd (Eklund m.fl., 2015). Baserat på den studien har nedanstående diagram framtagits för Jämtlands län över extrem nederbörd med 1-timmes varaktighet (figur 4). Diagrammen beskriver den procentuella ökningen av 1-timmesnederbörd för perioden 2069-2098 jämfört med referensperioden 1961-1990.

Resultatet presenteras för olika återkomsttider, ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Se ytterligare förklaring i Ordlistan.




Figur 4. Procentuell förändring av nederbörd med varaktigheten 1 timme mellan perioderna 2069-2098 och 1961-1990 för Jämtlands län. Punkterna representerar medianvärden och vertikala streck visar spridningen mellan de olika modellberäkningarna.

Den extrema 1-timmesnederbörden förväntas öka, och RCP8.5 visar på större förändring än RCP4.5. Ökningen är störst för de längre återkomsttiderna, dvs. de mer ovanliga extrema skurarna. Dock visar beräkningarna även på 15-25 % ökning för de årligen återkommande skurarna.

6 Total medeltillrinning

Avsnittet behandlar den totala tillrinningen dvs. det ackumulerade flödesbidraget från alla avrinningsområden som ligger uppströms, även utanför länsgränsen. Indexen kan vara av intresse för att bedöma vattentillgång till kraftproduktion och vattenuttag, samt för planering av markanvändning, som exploatering i områden kring sjöar och vattendrag. Kartan i Figur 5 visar utvalda analyspunkter för total medeltillrinning (röda punkter), analysområden för lokal tillrinning (gula områden) och länets huvudorter (svarta punkter).



Figur 5. Kartan visar avrinningsområden (röda linjer) och delområden enligt HBV-modellen (ljusgrå linjer). Röda punkter markerar de vattendragspunkter som presenteras i diagram med total tillrinning i rapporten. Svarta punkter visar länets huvudorter. De gulmarkerade områdena avser beräkningarna för lokal tillrinning, markfuktighet och snö. Jämtlands län markeras med mörkgrå linje.

6.1 Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger

Den framtida totala årsmedeltillrinningen för Jämtlands län kommer enligt studerade scenarier att öka. I medeltal visar diagrammen på en ökning av den totala årsmedeltillrinningen över hela länet kring 10-20 % beroende på aktuellt område. Den absolut största förändringen sker under vinterperioden då det i samband med varmare vintrar blir vanligare att nederbörden faller som regn istället för snö.

Den totala årsmedeltillrinningen visar att ökningen i de båda scenarierna följs åt fram till mitten av seklet, kring 10 %. Vissa områden har en mer blygsam ökning i scenariot RCP8.5 fram till 2030 varefter förändringen är kraftig. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och är relativt jämnt fördelad över länet, detta framgår även av diagrammen.

Av diagrammen framgår att medeltillrinning vintertid i medeltal kan öka med så mycket som 130-150 % (RCP8.5). Även RCP4.5 ger stora ökningar för samtliga vattendrag (40-90 %).


Vårens förändringar blir lägre jämfört med vinterns. Inom länet visar områdena i Ljusnans avrinningsområde (Hoan, Härjån, Ljusnan nedan Råndan och Ljusnan nedan Lunen) samt Faxälven på störst förändring. Områdena i Indalsälvens avrinningsområde visar endast en liten ökning av vårtillrinning.

Enligt studerade scenarier kommer sommarens medeltillrinning att minska i många av länets områden. Endast områden i Ljusnans avrinningsområde visar på en liten ökning av tillrinningen sommartid.


Om höstens nederbörd i ett framtida varmare klimat i större mängd faller som regn istället för snö kan en ökad tillrinning vara förväntad över hela länet under denna period, uppemot 40 % för RCP 8.5 och ca 20- 30 % för RCP 4.5.

Förändrad total årsmedeltillrinning


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




Förändrad total medeltillrinning vinter


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




Förändrad total medeltillrinning vår


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




Förändrad total medeltillrinning sommar


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




Förändrad total medeltillrinning höst


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




6.2 Förändrad total 10-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 10 år. Kartor och diagram ger en uppfattning om hur relativt vanliga högflöden kommer att öka eller minska och var det sker. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.




För flöden med återkomsttid 10 år är de beräknade framtida förhållandena i länet lite blandade. Mot slutet av seklet ser de sydvästliga delarna av länet ut att få ökande 10-årsflöden. Diagrammen visar att 10-årsflödena för Dammån och Ljusnan ökar något men för övriga vattendrag är mer eller mindre oförändrade eller minskande.


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodsströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan




6.3 Förändrad total 100-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år och kan vara till hjälp vid bedömningar av översvämningsrisker längs sjöar och vattendrag.




Kartorna uppvisar stora likheter med 10-årstillrinningen med ökande 100-årstillrinning för de sydvästra delarna av länet och minskande eller oförändrade tillrinningar i övriga delar av länet. Även diagrammen uppvisar samma utveckling som för 10-årstillrinningen med ökande 100-årstillrinning för Dammån och Ljusnan.


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodsströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan



Hoan




7 Lokal medeltillrinning

Avsnittet behandlar den lokala tillrinningen, dvs. flödesbidraget från enbart det aktuella avrinningsområdet (utan bidrag från avrinningsområden som ligger uppströms). Detta ger en bild av hur mindre vattendrag vars vattenföring² enbart beror på lokala förhållanden, påverkas. Indexen kan användas för att se hur klimatförändringar förväntas förändra de lokala flödesmängderna, vilka bland annat påverkar förutsättningarna för liv i vattnet. Indexen kan även användas för att bedöma förändring av potentialen för kraftproduktion i mindre vattendrag.

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Diagram visas i detta avsnitt för endast två delavrinningsområden, vilka är markerade i Figur 5. Indalsälven representerar områden väster i länet med större snöpåverkan och Faxälven representerar områden längre österut i länet.


7.1 Förändrad lokal årsmedeltillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning på årsbasis.




² Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag

Faxälven




Indalälven



Den lokala årsmedeltillrinningen ökar enligt scenarierna för hela länet. Årsmedeltillrinningen ökar mest i de östra delarna av länet. Det framgår även av diagrammen, som visar en ökad årlig tillrinning med 20-25 % i slutet av seklet för Faxälven. Fram till mitten av seklet följs scenarierna åt även om ökningen är något större för RCP8.5 i slutet av seklet. För de mer snörika västra delarna av länet ses också en ökning av den lokala årsmedeltillrinningen, i diagrammet för övre Indalsälven ses en ökning på 10-20 %, även här visar RCP 8.5 på en större ökning än RCP 4.5.

7.2 Förändrad lokal medeltillrinning vinter


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under vintern, här definierad som perioden december-februari.




Den största förändringen av lokal tillrinning sker liksom för den totala tillrinningen vintertid, vilket kan förklaras av ökad nederbörd och mindre andel som faller som snö. Här är den största ökningen i de västra delarna av länet. Både för Faxälven och Indalsälven följs scenarierna åt till mitten av seklet. Därefter ökar RCP8.5 kraftigare. För Faxälven visar RCP8.5 en ökning med drygt 100 % och för Indalsälven visar RCP 8.5 en ökning på över 200 % vid slutet av seklet. RCP4.5 landar på dryga 50 % för Faxälven och drygt 100 % för Indalsälven.

7.3 Förändrad lokal medeltillrinning vå


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under våren, här definierad som perioden mars-maj.



Faxälven




Indalsälven



Den lokala tillrinningen under våren påverkas tydligt av förändrad snöförekomst i framtiden. Även här är ökningen störst i de västra delarna av länet.

7.4 Förändrad lokal medeltillrinning sommar


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under sommaren, här definierad som perioden juni-augusti.



För sommarperioden visar scenarierna minskad tillrinning främst för de västliga delarna av länet vilket också ses i diagrammet för Indalsälven. För Faxälven, liksom stora delar av länet syns en svagare minskning av tillrinningen.

7.5 Förändrad lokal medeltillrinning höst


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under hösten, här definierad som perioden september-november.



För höstperioden kan ökad tillrinning väntas för större delen av länet, dock inte lika stor som under vintern. Faxälven uppvisar en ökning kring 20 % vid slutet av seklet enligt scenarierna. För Indalsälven ses en något större ökning, knappt 50 %.

7.6 Förändrad lokal 10-årstillrinning


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser lokal tillrinning med återkomsttid 10 år och visar hur relativt vanliga högflöden kommer att öka eller minska. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.



Liksom för den totala 10-årstillrinningen är förändringen av den lokala 10-årstillrinningen lite olika över länet. Mot slutet av seklet ser de sydvästliga delarna av länet ut att få ökande 10-årsflöden, medan de norra delarna av länet ser ut att få minskande 10-års flöden. De två utvalda områdena visar på ganska liten förändring med en ganska stor osäkerhet som troligen kan kopplas till hur snötäcket utvecklas i de olika modellberäkningarna.

7.7 Förändrad lokal 100-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser lokal tillrinning med återkomsttid 100 år och har intresse för utbredningskarteringar av översvämningar.



Kartorna uppvisar stora likheter med 10-årstillrinningen, med minskande 100-årstillrinning för de norra delarna av länet och ökande tillrinningar i de sydväsliga delarna. Även diagrammen uppvisar samma utveckling som för 10-årstillrinningen med en liten förändring och stora osäkerheter.

8 Tillrinningens årsdynamik


Tillrinningen varierar mellan år och under året beroende på hur nederbörd, temperatur, snötäcke, markfuktighet och avdunstning varierar och samspelar. För vattendragen ses dock vanligen en återkommande dynamik under året. Förändringar i årstidsförloppen kan ha stor betydelse för vattenförsörjning, miljö och biologisk mångfald, översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion.

I figurerna visas medelvärden för tillrinningens årsdynamik. Svart linje representerar referensperioden 1963-1992 och de två övriga linjerna representerar framtidsperioden 2069-2098. Blå linje avser medelvärden av beräkningar enligt RCP4.5 och röd linje representerar motsvarande för RCP8.5.


Samtliga vattendrag uppvisar tydliga årstidsförlopp för referensperioden, med vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Givetvis med variationer mellan de olika områdena och med variationer mellan åren.

I samtliga områden visar framtidsscenarierna på tidigare vårflödestoppar, högre vinter- och höstflöden, men mönstret över årstidsförloppet kvarstår och tillrinningen under sommaren påverkas inte.


Faxälven




Ytterån




Järpströmmen




Hårkan




Storbodsströmmen




Ammerån




Dammån




Galån




Ljusnan nedan Lunen




Härjån



Ljusnan nedan Råndan




Hoan



9 Snö


9.1 Antal dagar med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll

Beräknat 1961-1990



I kartbilderna visas antal dagar med snötäcke med minst 5 mm vatteninnehåll. Det ger en uppfattning om hur länge marken är snötäckt i medeltal och kan vara av intresse för planering av infrastruktur, turism och friluftsanläggningar, rennärning, naturvårdsinsatser och miljöövervakning.


Beräknat 1961-1990




Beräknat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



Faxälven



Indalsälven




Antalet dagar med snö varierar över länet. Från den snörika fjällregionen i väst till de östra delarna av länet med något färre antal snö dagar. Vid slutet av seklet visar de östliga delarna på 60-80 dagar med snötäcke enligt RCP8.5 och 80-100 dagar med RCP4.5. För de västra delarna av länet ses ca 180-200 dagar med snötäcke beroende på scenario.

De två delavrinningsområdena visar successivt minskande snötäcken. För avrinningsområdet i Faxälven går antalet snö dagar med mer än 5 mm vatteninnehåll från ca 160 dagar till 80-120 dagar vid slutet av seklet. För det mer västligt belägna området i Indalsälven minskar antalet dagar från knappt 280 till 200-220 vid slutet av seklet, beroende på scenario.


9.2 Antal dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll

Beräknat 1961-1990




I kartbilderna visas antal dagar med snötäcke med minst 20 mm vatteninnehåll. Det kan tolkas som antal dagar då det är goda förhållanden för skidåkning. Kartorna ger en uppfattning om hur snöförhållandena för skidåkning förändras och kan därför användas för långsiktig planering av turism och friluftsanläggningar.


Beräknat 1961-1990





Beräknat 1991-2013



Beräknat 2021-2050





Beräknat 2069-2098




RCP4.5


RCP8.5



Faxälven



Indalsälven




Liksom för föregående index ses att snöförhållandena varit något sämre i medeltal perioden 1991-2013 jämfört med 1961-1990. Antalet dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll minskar och i mitten på seklet är det ca 80 dagar i de östra delarna av länet. För de västra delarna är då fortfarande ca 160 dagar i medeltal med snötäcke över 20 mm. Mot slutet av seklet har antalet dagar ytterligare minskat till ca 120-60, beroende på scenario.

För det mer västligt belägna området i Indalsälven minskar antalet dagar från knappt 240 till ca 180-200. Enligt RCP8.5 sker den största minskningen efter mitten på seklet. Vid området i Faxälven sker en större förändring, från ca 130 dagar i medeltal till knappt 40 dagar enligt RCP8.5.

9.3 Förändrat maximalt snötäcke


Indexet avser det maximala (största) snötäcket i termer av vatteninnehåll. Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet ger en uppfattning om hur mycket nederbörd som maximalt lagras i snötäcket under vintern. Det har betydelse för vattenflödena under våren och är av intresse för vattenkraftens reglering. Indexet kan också vara intressant avseende snölasten för konstruktioner.



Det maximala snötäcket minskar över hela länet och mot slutet av seklet har snötäcket minskat med 20-70 %. För det östliga området i Faxälvens avrinningsområde ser förändringen ut att bli kring -20 % till mitten av seklet men minskningen blir större mot slutet av seklet, ned mot -60 % med RCP8.5. För området i Indalsälven är minskningen svagare, 15-30 %.


10 Markfuktighet

Beräknat 1961-1990




Antal dagar per år med låg markfuktighet. Indexet baseras på referensperiodens medelvärde av varje års lägsta markfuktighet. Indexet kan ha intresse för långtidsplanering av bevattningsbehov och grödval samt skogsbrandriskbedömning och skogsvårdsinsatser.


Beräknat 1961-1990




Beräknat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



Faxälven



Indalsälven



Perioden 1991-2013 har haft fler dagar med låg markfuktighet jämfört med 1961-1990. Denna tendens fortsätter under seklet och de två RCP-scenarierna visar relativt stora skillnader vid seklets slut. För större delen av länet visar RCP4.5 på 25-35 dagar och RCP8.5 på 35-45 dagar. För den västra delen av länet är minskningen något mindre.

Faxälvens avrinningsområde har i dagens klimat drygt 10 dagar med låg markfuktighet. Antalet dagar ökar långsamt men efter mitten på seklet sker ökningen snabbare till 25-35 dagar i genomsnitt årligen, beroende på scenario. I avrinningsområdet i Indalsälven är antalet dagar med låg markfuktighet knappt 10 i dagens klimat. Förändringen framöver är något större än för området i Faxälven. Från 30 dagar till 45 vid seklets slut.

11 Slutsatser

Hur klimatet i Jämtlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen ser ut i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. I rapporten har beräkningar med två olika utvecklingsvägar analyserats fram till seklets slut. Scenariot RCP4.5 beskriver en framtid med kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar, men för scenariot RCP8.5 fortsätter utsläppen att öka.

Års**medeltemperaturen** i Jämtland ligger idag (1961-1990) på ca 0°C i fjällen och ca 1,5°C i lågterräng. Analyserna av framtida klimat visar en gradvis uppvärmning. I mitten på seklet visar båda RCP-scenarierna en uppvärmning på ca 2 grader jämfört med perioden 1961-1990. I slutet av seklet visar RCP4.5 en uppvärmning på ca 3 grader medan RCP8.5 hamnar på ca 5 grader. Störst uppvärmning väntas ske under vintern, med drygt 5 grader enligt RCP8.5.

I och med uppvärmningen ökar **vegetationsperiodens** längd, för RCP4.5 med ungefär en månad och för RCP8.5 ca 50 dagar. **Värmeböljorna** förväntas också öka då antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 8 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

En varmare atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation vilket ger mer nederbörd. Analyserna av års**medelnederbörd** bekräftar större regnmängder i det framtida klimatet. Årsmedelnederbörden väntas öka med 20 % för RCP4.5 och drygt 30 % för RCP8.5. Nederbörden ökar mest vintertid, i östra delen av länet visar RCP8.5 på 40 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15- 20 % beroende på RCP-scenario.

För länet ses en ökning av år**tillrinningen** med uppemot 10 % vid mitten av seklet. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och är relativt jämnt fördelad över länet. Den största ökningen av tillrinningen sker för vintern och även det lägre scenariot RCP4.5 visar på 40-90 % för vattendragen. Under sommaren minskar tillrinningen.

Tillrinning med **återkomsttid** 10 år respektive 100 år ser ut att öka i de sydvästliga delarna av länet, för övriga delar av länet är tillrinningen mer oförändrad eller minskande. Dammån och Ljusnan uppvisar ökande 100-årstillrinning.

Vattendragen har under referensperioden haft tydliga **årstidsförlopp**, med vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Dessa förändras i princip inte enligt framtidsscenarierna men flödet blir något mer utjämnat över året. Vårflödestoppen kommer tidigare och det finns områden som får både lägre och högre vårflödestopp.

Antalet dagar med **snö** varierar över länet. Enligt klimatscenarierna minskar snötäcket generellt i länet men främst i de östra delarna av länet. Den västliga delen av länet påverkas mindre. Antalet dagar med låg **markfuktighet** ökar i framtiden. Från dagens 8-10 dagar till 25-30 dagar (RCP4.5) eller 35-45 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Beskrivningen baseras på medelförhållanden men det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

12 Tackord

Förutom rapportförfattarna har även Kristoffer Hallberg, Joel Dahné och Johan Andréasson bidragit till rapporten. Tack också till alla som deltog i arbetet med nedskalning av RCP-scenarierna.

13 Referenser

- Eklund A., Axén-Mårtensson J., Bergström S., Björck E., Dahné J., Lindström L., Nordborg D., Olsson J., Simonsson L. och Sjökvist E. 2015. Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattenutredningen. SMHI Klimatologi Nr 14.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-framtida-klimat-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.89524>
- Eklund D. 2011. Klimatsammanställning – Fjällkedjan. SMHI rapport nr 2011-40.
- ICONICS, 2013. Nakićenović N., Lempert R., and Janetos A (eds.). A Special Issue of Climatic Change journal on the Framework for the Development of New Socioeconomic Scenarios for Climate Change Research. <https://www2.cgd.ucar.edu/research/iconics/publications/ssps>
- IPCC 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Nougier, M., van der Linden, P.J. Dai, X., Maskel, K. and Johnsen, C.A. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881 pp. http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
- IPCC 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html
- IPCC 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>
- Nakićenović N., and R. Swart (eds.) 2000. Special Report on Emissions Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 599 pp.
<https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf>
- Persson G., Strandberg G. och Berg P. 2015. Vägledning för användande av klimatscenarier. SMHI Klimatologi Nr 11. <http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier>
- Persson G., Eklund D., Ohlsson A., Sjökvist E. och Asp M. 2013. Klimatanalys för Jämtlands län. SMHI rapport nr 2013-69.
- Sjökvist E., Axén Mårtensson J., Dahné J., Köplin N., Björck E., Nylén L., Berglöv G., Tengdelius Brunell J., Nordborg D., Hallberg K., Södling J. och Berggreen-Clausen S. 2015. Klimatscenarier för Sverige – Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier. SMHI Klimatologi Nr 15.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/klimatscenarier-for-sverige-bearbetning-av-rcp-scenarier-for-meteorologiska-och-hydrologiska-effektstudier-1.87248>

SMHIs publiceringar

SMHI ger ut sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket.

Seriernas namn	Publiceras sedan
RMK (Report Meteorology and Climatology)	1974
RH (Report Hydrology)	1990
RO (Report Oceanography)	1986
METEOROLOGI	1985
HYDROLOGI	1985
OCEANOGRAFI	1985
KLIMATOLOGI	2009

I serien KLIMATOLOGI har tidigare utgivits:

- | | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | Lotta Andersson, Julie Wilk, Phil Graham, Michele Warburton (University KwaZulu Natal) (2009)
Local Assessment of Vulnerability to Climate Change Impacts on Water Resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for Adaptation | 6 | Jonas Olsson och Kean Foster (2013)
Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige |
| 2 | Gunn Persson, Markku Rummukainen (2010)
Klimatförändringarnas effekter på svenskt miljömålsarbete | 7 | FNs klimatpanel – Sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet. Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2014) |
| 3 | Jonas Olsson, Joel Dahné, Jonas German, Bo Westergren, Mathias von Scherling, Lena Kjellson, Fredrik Ohls, Alf Olsson (2010)
En studie av framtida flödesbelastning på Stockholms huvudavloppssystem | 8 | Att begränsa klimatförändringar (2014) (Ej publicerad) |
| 4 | Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar, Joakim Langner, Ralf Döscher, Henrik Smith (2011)
Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet. En översyn av natur-vetenskapliga aspekter | 9. | Erik Kjellström SMHI. Reino Abrahamsson, Pelle Boberg. Eva Jernbäcker Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel
Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI (2014)
Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget |
| 5 | Sten Bergström (2012)
Framtidens havsnivåer i ett hundraårsperspektiv – kunskapssammanställning 2012 | 10. | Risker och konsekvenser för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt (2014) |
| | | 11. | Gunn Persson (2015)
Vägledning för användande av klimatscenarier |
| | | 12 | Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelus (2015)
Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat |

13. Gunn Persson (2015)
Sveriges klimat 1860-2014. Underlag till Dricksvattenutredningen.
14. Anna Eklund (2015)
Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattensutredningen.
15. Elin Sjökvist, Jenny Axén Mårtensson, Joel Dahné, Nina Köplin, Emil Björck, Linda Nylén, Gitte Berglöv, Johanna Tengdelius Brunell, Daniel Nordborg, Kristoffer Hallberg, Johan Södling, Steve Berggreen-Clausen (2015)
Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier
16. Elin Sjökvist, Gunn Persson, Jenny Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson (2015)
Framtidsklimat i Dalarnas län – enligt RCP-scenarier.
17. Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Värmlands län – enligt RCP-scenarier.
18. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Örebro län – enligt RCP-scenarier.
19. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västmanlands län – enligt RCP-scenarier.
20. Elin Sjökvist, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson (2015)
Framtidsklimat i Uppsala län – enligt RCP-scenarier.
21. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier.
22. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Södermanlands län – enligt RCP-scenarier.
23. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Östergötlands län – enligt RCP-scenarier.
24. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scenarier.
25. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Jönköpings län – enligt RCP-scenarier.
26. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Kalmar län – enligt RCP-scenarier.
27. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Kronobergs län – Enligt RCP-scenarier.
28. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Hallands län – enligt RCP-scenarier.

29. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Skåne län – enligt RCP-scenarier.
30. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier.
31. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier.
32. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Norrbottens län – enligt RCP-scenarier.
33. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västerbottens län – enligt RCP-scenarier.



Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

ISSN 1654-2258