


Framtidsklimat i Västerbottens län

– enligt RCP-scenarier

Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist



Pärmbilden visar observerad årsmedeltemperatur för perioden 1991-2013.

ISSN: 1654-2258 © SMHI

KLIMATOLOGI Nr 33, 2015

Framtidsklimat i Västerbottens län

– enligt RCP-scenarier

Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen- Clausen, Emil Björck, Jenny Axén
Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist

Sammanfattning

Hur klimatet i Västerbottens län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västerbotten baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Geografiskt detaljerade klimatdata har framtagits och använts för hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av modelldata.

Temperaturen för Västerbottens län beräknas öka med ca 3 grader enligt RCP4.5 och ca 6 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot 7 grader enligt RCP8.5. Vegetationsperioden ökar med ca 30-50 dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på ca 8 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med ca 20-40 %. Nederbörden ökar mest under våren där RCP8.5 visar på en 50 % ökning i vissa områden. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15- 25 % beroende på RCP-scenario.

För länet ses en ökning av totala årstillrinningen med uppemot 10 % vid mitten av seklet. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och den procentuellt största ökningen sker vintertid.

Vattendragen har under referensperioden haft tydliga årstidsförlopp, med vårflodestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Mönstret för årstidsförloppet kvarstår men framtidsscenarierna visar på tidigare vårflodestopp, och högre vinter- och höstflöden. Förändringen av tillrinningen under sommaren är inte lika tydlig och varierar från område till område.

Antalet dagar med snö varierar över länet. Enligt klimatscenarierna minskar snötäcket generellt i länet och trenden är starkast för RCP8.5. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Från dagens 5-15 dagar till 20-40 dagar (RCP4.5) eller 25-50 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Summary

The report describes today's and future climate in Västerbotten County based on observations and climate modelling. Regional modelled RCP4.5 and RCP8.5 scenarios have been further downscaled to 4×4 km² resolution. The results are presented as meteorological and hydrological indices based on statistically processed model data.

Ordlista

Avrinningsområde	Det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid en angiven plats.
DBS-metoden	"Distribution Based Scaling" är ett verktyg för att korrigera klimatmodellernas utdata så att de kan användas som indata till hydrologisk modellering. Med DBS-skalering fås en högre rumslig upplösning av data.
Flöde	Här avses vattenflöde dvs. hur mycket vatten som rinner i vattendragen.
Global klimatmodell (GCM)	På engelska "Global Circulation Model" eller "Global Climate Model". En global klimatmodell beskriver hela jordklotet och de processer som sker i atmosfären, havet, havsisen och marken.
Gridbox	I en klimatmodell delas atmosfären upp i tredimensionella lådor, så kallade gridboxar. I varje gridbox räknas alla klimatologiska variabler ut som beskriver klimatet i den boxen.
HBV	En hydrologisk modell som beräknar markfuktighet, snöackumulation, snösmältning, avdunstning och avrinning/tillrinning samt beskriver vattnets väg i avrinningsområdet.
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change. Även benämnd FN:s klimatpanel.
Klimatindex	Bearbetade utdata från klimatmodeller. De kan beskriva medelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden.
Klimatscenario	En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser, en global och en regional klimatmodell.
Osäkerhet	Det finns olika källor till osäkerheter i frågan om framtidens klimat. Den största osäkerheten ligger i hur mycket växthusgaser människan kommer släppa ut i framtiden. Det finns även osäkerheter i klimatmodellerna, t.ex. beroende på begränsad upplösning i både tid och rum.
RCA	Rosby Centre Regional Climate model (RCA) är en regional klimatmodell som utvecklas och används av SMHI:s klimatforskningsgrupp.
RCP	RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet "representativa koncentrationsutvecklingsbanor" från engelskans "Representative Concentration Pathways (RCP)". RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i W/m^2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013.
Referensperiod	SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att definiera dagens klimat. Nya observationer jämförs med medelvärdet för 1961-1990 för att säga hur de avviker från det normala. Meteorologiska världsorganisationen, WMO, definierar referensperioderna och nästa period blir 1991-2020.
Regional klimatmodell (RCM)	Beskriver klimatet för en del av jordklotet, en region. En regional klimatmodell använder alltid indata från en global klimatmodell.
SRES	Scenarier som beskriver framtida utsläpp av växthusgaser, baserade på antaganden om den framtida utvecklingen av världen. SRES-scenarier användes i de beräkningar av

	framtidens klimat som låg till grund för arbetet med IPCC:s rapporter från år 2000 och 2007. SRES= Special Report on Emission Scenarios.
Strålningsdrivning	Strålningsdrivningen är skillnaden mellan hur mycket energi solstrålningen som träffar jorden innehåller och hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden igen. Denna energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m ² . Strålningsdrivningen ökar då mängden växthusgaser ökar i atmosfären, vilket resulterar i en global ökning av temperaturen på jorden. För att studera framtida klimat finns ett antal strålningsdrivningsscenarier att utgå ifrån, se "RCP".
Trend	Här används begreppet som "en förändring över tid".
Upplösning	Upplösningen är storleken på gridboxarna i klimatmodellen. Låg upplösning (stora gridboxar) ger mindre detaljerad information, men kostar mindre datorkraft. Hög upplösning (små gridboxar) ger mer detaljerad information, men kostar mer datorkraft.
Variabilitet	Variabilitet är en viktig faktor inom klimatologin. Klimatet är inte bara genomsnittliga värden utan klimat kännetecknas av variationer i tid och rum som kan hänga ihop med till exempel växelverkan mellan atmosfären och havet.
Växthusgaser	Atmosfären som omger jorden har förmågan att bevara energin från solen så att jordytan blir varmare än vad den skulle varit om atmosfären inte fanns. Den s.k. naturliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av en viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären. Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna. Atmosfärens sammansättning har sedan den förindustriella tiden successivt förändrats på grund av mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon, men även en rad industrigaser spelar roll.
Återkomsttid	Ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Ett värde som har en återkomsttid på 100 år uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år. Det innebär att sannolikheten är en (1) procent varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större. För en konstruktion vars livslängd beräknas till 100 år blir den ackumulerade risken hela 63 % att 100-årsvärdet överskrids någon gång under 100 år. Om säkerhetsnivån väljs till 100-årsvärdet är risken att det värdet överskrids större än att det underskrids. Det är alltså troligare att konstruktionen, under sin livslängd, kommer att utsättas för förhållanden utöver den nivå som valts än att den nivån aldrig inträffar. För 10-årsvärdet är sannolikheten 65 % att det överskrids någon gång under 10 år.

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	1
2	BAKGRUND	1
3	METOD OCH PRESENTATION	1
3.1	Antaganden, modeller och databearbetning.....	1
3.2	Osäkerheter	2
3.3	Generella resultat för Sverige	3
3.4	Jämförelse SRES-RCP.....	3
3.5	Läsanvisningar.....	5
3.5.1	Kartor	5
3.5.2	Diagram	5
4	TEMPERATUR	7
4.1	Årsmedeltemperatur	7
4.2	Medeltemperatur vinter.....	9
4.3	Medeltemperatur vår	11
4.4	Medeltemperatur sommar	13
4.5	Medeltemperatur höst.....	15
4.6	Vegetationsperiodens längd	17
4.7	Vegetationsperiodens starttidpunkt	19
4.8	Värmebölja.....	21
5	NEDERBÖRD.....	23
5.1	Årsmedelnederbörd	23
5.2	Medelnederbörd vinter.....	25
5.3	Medelnederbörd vår	27
5.4	Medelnederbörd sommar	29
5.5	Medelnederbörd höst.....	31
5.6	Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd.....	33
5.7	Maximal dygnsnederbörd.....	35
5.8	Förändring av korttidsnederbörd.....	37
6	TOTAL MEDELTILLRINNING	38
6.1	Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger.....	39
6.2	Förändrad total 10-årstillrinning	50
6.3	Förändrad total 100-årstillrinning	53
7	LOKAL MEDELTILLRINNING.....	56
7.1	Förändrad lokal årsmedeltillrinning.....	56

7.2	Förändrad lokal medeltillrinning vinter	58
7.3	Förändrad lokal medeltillrinning vår.....	59
7.4	Förändrad lokal medeltillrinning sommar	60
7.5	Förändrad lokal medeltillrinning höst	61
7.6	Förändrad lokal 10-årstillrinning.....	62
7.7	Förändrad lokal 100-årstillrinning.....	63
8	TILLRINNINGENS ÅRSDYNAMIK	64
9	SNÖ	67
9.1	Antal dagar med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll	67
9.2	Antal dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll	69
9.3	Förändrat maximalt snötäcke.....	71
10	MARKFUKTIGHET	72
11	SLUTSATSER	74
12	TACKORD	74
13	REFERENSER	75

1 Inledning

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västerbotten baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av data.

2 Bakgrund

FN:s klimatpanel presenterade 2013 en ny rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013). Resultaten baserades på nya möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). SMHI fick 2014 i uppdrag av regeringen att göra en enhetlig studie för Sverige baserad på dessa scenarier. Studien finansierades via det klimatanpassningsanslag som tilldelades Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Arbetet resulterade i databasen SCID med statistik i form av klimatindex för Sveriges nutida och framtida klimat. Databasen, tillsammans med en rapport och beskrivande dokument, finns tillgänglig som en nedladdningstjänst på smhi.se. Rapporten "Klimatscenarier för Sverige" beskriver metoder, resultat och osäkerheter, vilket är viktigt att ha kunskaper om vid studier av framtida klimat på läns- och kommunnivå (Sjökvist m.fl., 2015).

I regleringsbrevet för 2015 avseende klimatanpassningsanslaget gavs SMHI i uppdrag att ta fram länsvisa enhetliga klimatanalyser baserade på de nya klimatscenierna. Den ovan nämnda databasen är utgångspunkten för analyserna i föreliggande rapport som avser Västerbottens län.

SMHI har tidigare levererat en klimatanalys på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten (Eklund m.fl., 2011).

3 Metod och presentation

I detta kapitel beskrivs metodiken mycket kortfattat. Mer information finns i rapporten "Klimatscenarier för Sverige" som nämns ovan. På smhi.se finns också en "Vägledning klimatscenarier" som stöd för användande av klimatscenarier (Persson m.fl., 2015). I Ordlistan finns flertalet begrepp definierade.

3.1 Antaganden, modeller och databearbetning

Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser förändras. För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som slår in beror på människans förmåga att begränsa utsläppen. RCP-scenarierna beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till år 2100. I följande analyser används två RCP-scenarier, RCP4.5 som bygger på begränsade utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp. Tabell 1 beskriver vilka antaganden som ligger till grund för scenarierna.

Forskarvärlden har fokuserat på dessa två scenarier, därför finns det mest fullständiga underlaget för dessa i form av regionala klimatberäkningar. Det är skälet till att dessa två scenarier använts i föreliggande rapport. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd vad avser framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.


Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för scenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

RCP4.5	RCP8.5
• Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring år 2040 • Befolkningsmängd något under 9 miljarder i slutet av seklet • Lågt arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster • Omfattande skogsplanteringsprogram • Låg energiintensitet • Kraftfull klimatpolitik	• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar kraftigt • Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion • Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt • Stort beroende av fossila bränslen • Hög energiintensitet • Ingen tillkommande klimatpolitik

För att göra beräkningar av det framtida klimatet krävs klimatmodeller, de är matematiskt formulerade beskrivningar av de fysikaliska processerna i klimatsystemet. De globala klimatmodellerna beskriver hela jorden och de regionala beskriver mer förfinat ett delområde. Indelningen sker i så kallade gridboxar, ett 3-dimensionellt rutnät av atmosfären. Det är mycket omfattande beräkningar som sker på superdatorer.

Den globala klimatmodelleringen görs med en relativt grov upplösning, vilket betyder att storleken på rutorna vid jordytan kan vara ca $200 \times 200 \text{ km}^2$. Den regionala klimatmodelleringen utförs med högre upplösning, ca $50 \times 50 \text{ km}^2$, och ger därför mer detaljerade beräkningar. I analysen ingår nio olika globala klimatmodeller från olika institut runt om i världen. Rossby Centre vid SMHI har utfört regional modellering med den regionala klimatmodellen RCA4.

För att utföra analyser på lokal skala, exempelvis för hydrologiska beräkningar, krävs data med ännu högre geografisk upplösning. SMHI har därför utvecklat en metod, DBS (Distribution Based Scaling), för att öka upplösningen till $4 \times 4 \text{ km}^2$. Därefter har hydrologisk modellering utförts med HBV-modellen. Flödesberäkningar baseras på oregerade förhållanden.



Statistik har beräknats i form av klimatindex, vilka är definierade i respektive avsnitt. Varje enskilt modellresultat har bearbetats separat men resultaten presenteras sammanlagda för RCP4.5 och RCP8.5. De index som berör temperatur och nederbörd, presenteras med $4 \times 4 \text{ km}^2$ upplösning. De hydrologiska indexen, som berör tillrinning, snö och markfuktighet, presenteras för avrinningsområden. Beräkningar av korttidsnederbörd (avsnitt 5.8) är utförd direkt på regional klimatdata.

3.2 Osäkerheter

Ett klimatscenario kräver en lång kedja av beräkningar och antaganden. Det finns alltså flera källor till osäkerheter; klimatets naturliga variationer, val av klimatmodell och framtida utsläpp av växthusgaser.

Den naturliga variationen innebär att klimatet varierar naturligt från år till år. Denna osäkerhet påverkar mest klimatscenarier för en nära framtid, eftersom klimatet inte hunnit förändras så mycket. Klimatförändringen är då svår att urskilja från den naturliga variationen i klimatet.

Alla klimatmodeller baseras på samma grundläggande kunskap om klimatsystemet och fungerar på ungefär samma sätt. Resultaten skiljer sig ändå åt beroende på att processerna i klimatsystemet kan beskrivas på olika sätt, och att fler eller färre processer inkluderas i modellerna. Ingen modell är perfekt, därför är det bra att sammanväga resultaten från olika modeller. Det ger ett mått på hur stor betydelse olika modellbeskrivningar har för det beräknade klimatet.

Framtidens klimat beror på framtida utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt resultat, som kan utläsas i klimatscenarierna, är att valet av RCP-scenario har mycket liten betydelse för de närmsta årtiondena. Mot mitten på seklet börjar valet av RCP-scenario växa i betydelse för klimatets utveckling.

3.3 Generella resultat för Sverige

I figur 1 och 2 visas översiktliga beräkningar av framtidens förändringar av temperatur och nederbörd i Sverige. Där redovisas även tidigare resultat baserade på s.k. SRES-scenarier. Skillnaderna kommenteras mer utförligt i kapitel 3.4.

Årsmedeltemperaturen beräknas öka för hela Sverige i framtiden. RCP8.5 visar generellt på störst uppvärmning (4-6 grader). RCP4.5 visar på samma mönster men en lägre uppvärmning (2-4 grader).

Nederbörden beräknas öka i framtiden. RCP8.5 visar störst förändring, särskilt i norra Sverige, där ökningen beräknats till 30-50 %. RCP4.5 visar samma förändringsmönster, men som mest 30 % ökning (i Lapplandsfjällen).

Medeltillrinningen väntas öka i hela landet utom i sydöstra Sverige, där det sker en minskning. Störst ökning sker i landets norra delar. RCP8.5 ger det mest extrema resultatet både där tillrinningen ökar och där den minskar.


Extrema vattenflöden, redovisade som 100-årsflöden¹, beräknas öka i vattendragen i södra Sverige mot slutet av seklet. I de nordliga älvarna är förändringen mindre tydlig och kan till och med medföra en minskning av de extrema flödena.

3.4 Jämförelse SRES-RCP


Klimatforskningen utvecklas hela tiden, nya resultat publiceras, liksom nya sätt att beskriva antaganden om framtida utsläpp. I FN:s klimatpanels tredje och fjärde stora sammanställning (IPCC, 2001 och IPCC, 2007) användes scenarierna SRES (Special Report on Emission Scenarios) (Nakićenović and Swart (eds.) 2000). I femte sammanställningen AR5 (IPCC, 2013) antogs de nya scenarierna RCP (Representative Concentration Pathways) (ICONICS, 2013).

I de tidigare länsanalyser som utförts av SMHI baseras resultaten på 16 SRES-scenarier med tyngdpunkt på utsläppsscenario A1B. För att få en uppfattning om hur dessa skiljer sig från de nya RCP-scenarierna visas här kartor på förändringen i temperatur för perioden 2069-2098 jämfört med 1961-1990 (figur 1).

Alla scenarier visar på en tydlig uppvärmning i hela landet och störst uppvärmning i norra Sverige. SRES-scenarierna har inte lika tydlig gradient mellan norra och södra Sverige som RCP-scenarierna. Uppvärmningen är generellt något lägre än i RCP8.5, men utmärkande för SRES-scenarierna är hög uppvärmning längs kusterna, framförallt norra Norrlandskusten. Det beror med stor sannolikhet på dataunderlaget till SRES-analysen, då temperaturdata längs kusten påverkades mycket av havsklimatet, vilket kan ge missvisande resultat. De höga värdena längs kusterna i SRES-kartan bör alltså tolkas med försiktighet.



Figur 1. Beräknad förändring av årsmedeltemperatur för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.



Figur 2. Beräknad procentuell förändring av årsnederbörden för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.

Kartorna i figur 2 visar förändringen i årsmedelnederbörd vid slutet på seklet jämfört med perioden 1961-1990. SRES-scenarierna är mycket lika RCP4.5, med en ökning på 10-30 %.

Skillnaderna är alltså olika beroende på vilken variabel som studeras och beror till stora delar på de klimatmodeller som använts i beräkningarna. För SRES-analyserna användes 16 olika uppsättningar av globala och regionala modeller, medan RCP-analyserna är baserade på nio olika globala modeller och en regional (RCA4). Det ger en bättre representation avseende globala beräkningar men i analysen har endast data från en regional modell varit tillgänglig, vilket kan ge ett snävt resultat. RCA4 har visat sig vara något blötare i jämförelse med andra regionala modeller, vilket betyder att samma RCP-scenarier kan uppvisa något torrare klimatförändring med andra kombinationer av globala och regionala modeller.

3.5 Läsanvisningar

På följande sidor presenteras index baserade på temperatur, nederbörd, tillrinning, snö och markfuktighet. Indexen beskrivs och resultaten presenteras i korta texter i respektive kapitel. Indexen presenteras lite olika vad gäller kartor och diagram, vilket beskrivs nedan.

3.5.1 Kartor

För temperatur- och nederbördsindex, antal dagar med snötäcke samt markfuktighet visas observerade och beräknade värden. För medeltemperatur och medelnederbörd samt antal dagar med mer än 10 mm nederbörd visas även kartor över förändringar mellan tidsperioder.

För index baserade på tillrinning samt maximalt snötäcke presenteras endast förändringar mellan tidsperioder. Förändringar anges som procentuell avvikelse från referensperioden.

Alla kartor visar medelvärden över en given tidsperiod. I de kartor som visar förändringar mellan tidsperioder är värdena geografiskt utjämnade för att underlätta tolkningen.

Sverigekartorna representerar respektive index för referensperioden 1961-1990 och visar hur förhållandena i länet relaterar till övriga Sverige.


3.5.2 Diagram

Diagrammen för temperatur och nederbörd visar utvecklingen över tid för länet som helhet jämfört med referensperioden 1961-1990. Tillrinning, snö och markfuktighet är beräknade utifrån hydrologisk modellering och diagrammen för de indexen visar utvecklingen över tid för ett definierat avrinningsområde, jämfört med referensperioden 1963-1992.

Diagram för temperatur och nederbörd innehåller staplar med observationer som är geografiska medelvärden för hela länet, se förklaring av diagrammets uppbyggnad i figur 3. För tillrinning, snö och markfuktighet finns inte motsvarande observerade värden att tillgå, därför saknar de diagrammen observationsstaplar.

Tillrinningens årsdynamik presenteras som 30-årsmedelvärden för referensperioden 1963-1992 och framtidsperioden 2069-2098.

Diagrammen över förändring av korttidsnederbörd avser länet som helhet.




Figur 3. Beskrivning av diagrammens struktur i rapporten.

4 Temperatur

4.1 Årsmedeltemperatur

Observerat 1961-1990

Årsmedeltemperatur är medelvärdet av varje års medeltemperatur beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur. Det är tillsammans med årsmedelnederbörd det mest använda indexet för att beskriva klimatet.



Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098




Temperatur (°C)




RCP4.5

RCP8.5



Förändring (°C)





**Förändring
2069-2098 vs 1961-1990**

RCP4.5



RCP8.5




Under perioden 1961-1990 var årsmedeltemperaturen för hela Västerbottens län 0,3°C. Variationen är dock stor i länet, i fjällen ca -1,5°C, men i lågterrängen i söder upp mot 0,8°C. Under början av 2000-talet ökade temperaturen något i länet och trenden att det blir varmare är tydlig i båda klimatscenarierna. I mitten av seklet, perioden 2021-2050, är resultaten från de båda RCP-scenarierna mycket lika, skillnaderna tydliggörs först under andra hälften av seklet.

I diagrammet visas förändringen över länet som helhet för de två RCP-scenarierna, årsvärden av observerad medeltemperatur för Västerbottens län är markerade som staplar. Staplarna visar att årsmedeltemperaturen i länet kan variera med ca 4 grader. Denna mellanårsvariation består även i framtiden, vilket framgår av de skuggade fälten i diagrammet. De heldragna linjerna visar 30-års löpande medelvärde av scenarierna för att förtydliga trender. Temperaturen väntas stiga med flera grader till slutet av seklet; enligt RCP4.5 med nästan 4 grader medan RCP8.5 visar på en 6-gradig ökning. I östra delen av länet hamnar årsmedeltemperaturen på 5-7°C och i fjälldalarna 3-5°C. För fjällens del innebär det att i slutet av seklet blir klimatet mildare än det idag är i södra delen av länet.

4.2 Medeltemperatur vinter

Observerat 1961-1990


Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098




Temperatur (°C)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (°C)





**Förändring
2069-2098 vs 1961-1990**

RCP4.5



RCP8.5




Västerbottens vintermedeltemperatur var under referensperioden 1961-1990 -11°C. Vintrarna har blivit något mildare i söder under de senaste 23 åren, men staplarna i diagrammet visar att mellanårsvariationen är stor. De två olika scenarierna visar samstämmigt på att det blir mildrare vintrar framöver. Enligt RCP4.5 blir det 4 grader varmare till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar på närmare 7 graders skillnad jämfört med referensperioden 1961-1990.

4.3 Medeltemperatur vår

Observerat 1961-1990

Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.



Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098



Temperatur (°C)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (°C)




Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Medeltemperaturen för våren under perioden 1961-1990 var $-0,6^{\circ}\text{C}$, och mellanårsvariationen är betydligt mindre jämfört med under vintern. De senaste dryga 20 åren har medeltemperaturen ökat med någon grad och trenden håller i sig under resten av århundradet. Den största ökningen sker enligt både RCP4.5 och RCP8.5 i länets östra del. Enligt RCP4.5 blir det i länet en ca 3 gradig temperaturökning medan RCP8.5 visar på omkring 5 graders ökning jämfört med 1961-1990.


4.4 Medeltemperatur sommar

Observerat 1961-1990


Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Temperatur (°C)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (°C)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Sommarmedeltemperaturen under 1961-1990 var 11,8°C. Sommaren är varmast i de sydöstra delarna av Västerbotten där medeltemperaturen låg på runt 12,5°C medan den i fjällen låg på 9,6°C under referensperioden. Temperaturen steg något under perioden 1991-2013 och temperaturen fortsätter att stiga succesivt och vid slutet av seklet väntas medeltemperaturen ligga på 15-17°C. Den största ökningen i sommarmedeltemperaturen sker i fjällen. Enligt RCP4.5 stiger temperaturen här med ca 3 grader, medan RCP8.5 visar på en nära 6-gradig temperaturökning.

4.5 Medeltemperatur höst

Observerat 1961-1990

Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.



Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098




Temperatur (°C)





RCP4.5

RCP8.5



Förändring (°C)

Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5**RCP8.5**

Medeltemperaturen för hösten låg på 0,6°C under 1961- 1990 för att stiga någon grad under perioden 1991 och 2013. Trenden med mildare höst håller i sig och fram till slutet av seklet har det blivit 3-5 grader varmare i hela länet.


Allmänt om årstiderna

Både RCP4.5 och RCP8.5 visar på en temperaturökning för alla årstiderna fram till slutet av seklet. Temperaturökningen kan indikera, om medeltemperaturer används för att definiera årstiderna, att hösten håller i sig längre och att våren kommer tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare och sommaren längre.

Den största temperaturökningen sker under vintermånaderna. Enligt RCP4.5 blir det drygt 3 grader varmare till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar på upp till 7 graders ökning jämfört med referensperioden 1961-1990. Den näst största temperaturökningen under året kan förväntas sommartid, då ökningen främst sker i fjällen. RCP4.5 visar på en ökning i medeltemperatur med 3 grader och RCP8.5 på 6 graders ökning jämfört med referensperioden.


4.6 Vegetationsperiodens längd

Observerat 1961-1990




Längden på vegetationsperioden är definierad som skillnaden mellan sluttidpunkt och starttidpunkt. Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning.

Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Antal dagar



RCP4.5

RCP8.5






Längden på vegetationsperioden¹ under perioden 1961-1990 för länet som helhet var 139 dagar. I fjällen är vegetationsperioden kortare (121 dagar) och i de sydöstra delarna är våren och hösten lite mildare med en vegetationsperiod på 145 dagar. Under de senaste dryga 20 åren har vegetationsperioden ökat med ungefär 1 vecka i stora delar av länet.

Klimatscenerierna visar tydligt att vegetationsperioden blir längre under de kommande årtiondena. Den största ökningen ses för fjällen. Fram mot slutet av århundrandet visar RCP4.5 på en ökning med generellt ca 4 veckor över hela länet. Temperaturen i scenario RCP8.5 är lite varmare än RCP4.5 under våren och hösten och detta syns tydligt på vegetationsperioden. Mellan de två scenerierna skiljer det ungefär 3 veckor. I fjällen sträcker sig vegetationsperioden i slutet av seklet enligt RCP8.5 upp till 5-6 månader. I sydöstra delen av länet blir vegetationsperioden enligt RCP8.5 upp mot 200 dagar lång.

¹ Vegetationsperioden definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett visst gränsvärde, som varierar för olika tillämpningar men ligger vanligen mellan +3°C och +5°C. Vegetationsperiod benämns ibland växtsäsong.

4.7 Vegetationsperiodens starttidpunkt

Observerat 1961-1990



Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Indexet baseras enbart på beräkningar med temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. Indexet ger tillsammans med vegetationsperiodens längd en uppfattning om framtida förhållanden för sådd och skördetidpunkter.

Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098




Dagnummer



RCP4.5

RCP8.5






Vegetationsperiodens start definieras här som första tillfället på året när dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C under 4 dagar i följd. Vegetationsperiodens start räknas då från den första av dessa fyra dagar. Starttiden kan variera en del från år till år, beroende på om vintern varit lång och kall eller om mildluft tidigt förs in. Under referensperioden 1961-1990 hamnar medelvärde för starttiden för vegetationen på dagnummer 133, vilket motsvarar mitten på maj. Under 90-talet och 2000-talet tidigareläggs vegetationsperiodens start allmänt med någon dag. Trenden håller i sig under resten utav århundradet. I slutet av seklet har starttidpunkten tidigarelagts med ca 2 veckor enligt RCP4.5 medan RCP8.5 visar på en tidigareläggning på drygt 20 dagar. Den största ökningen väntas i södra Västerbotten där vegetationsperioden, vid seklets slut, kan komma att starta i mitten av april enligt RCP8.5.

Analyserna av vegetationsperiodens start och längd visar att vegetationsperiodens slut förändras ungefär lika mycket som starttidpunkten. I slutet av seklet senareläggs sluttidpunkten med ca 2 veckor enligt RCP4.5 och ca 1 månad enligt RCP8.5.


4.8 Värmebölja

Observerat 1961-1990



Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner. Här definieras värmebölja som årets längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20°C. Indexet belyser behovet av anpassning till perioder med höga temperaturer för t.ex. byggnader och vård- och omsorgssektorn.

Observerat 1961-1990



Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar



RCP4.5

RCP8.5






Under perioden 1961-1990 var det bara ett fåtal tillfällen varje år som dygnsmedeltemperaturen kom över 20°C, detta inträffade främst längs kusten, i fjällen var det sällsynt med så varma dagar. Medelvärde för länet som helhet var 0,8 dagar. Det har under de senaste drygt 20 åren blivit något varmare och antalet sammanhängande dagar med medeltemperaturer över 20°C har ökat med ca 1-2 dagar i länet. Under de kommande åren visar beräkningarna på längre perioder med dygnsmedeltemperaturer över 20°C. Skillnaden är störst för RCP8.5, i vilket värmeböljornas längd har ökat med ca 8 dagar i slutet av seklet. I fjällen rör det sig i genomsnitt om ca 6 dagar i följd och i de sydöstra delarna kan det röra sig om upp till 9 dagar i följd med värmebölja. Ökningen är inte fullt lika stor i RCP4.5 där det handlar om några få dagars ökning.

5 Nederbörd


5.1 Årsmedelnederbörd

Observerat 1961-1990


Årsmedelnederbörd är medelvärdet av varje års summerade dygnsnederbörd. Det är tillsammans med årsmedeltemperatur det mest använda klimatindexet för att beskriva klimatet.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Årsmedelnederbörden i Västerbotten var under perioden 1961-1990 696 mm. Det regnar och snöar mest i västra delen av fjällkedjan, eftersom våra vädersystem vanligen kommer västerifrån. Diagrammet visar att mellanårsvariationen är stor (se de svarta observationsstaplarna). Under de senaste 23 åren har nederbörden ökat något. I ett framtida klimat väntas nederbörden öka, vilket båda RCP-scenarierna visar. Ökningen är störst i RCP8.5, nära 40 % till slutet av seklet, medan RCP4.5 visar på en ökning på ca 20 %. Förändringskartorna visar att ökningen är störst i området norr om Storuman.


5.2 Medelnederbörd vinter

Observerat 1961-1990


Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Vinternederbörden i Västerbotten faller mest som snö och är störst i de nordvästliga delarna av länet. Årsmedelvärdet i smält form var under perioden 1961-1990 148 mm (211 mm i fjällen och 128 mm i den mer låglänta terrängen). Diagrammet visar att mellanårsvariationen är mycket stor, skillnader på 50 % från år till år är inte ovanlig. Liksom årsmedelnederbörden har vinternederbörden ökat de senaste 23 åren. RCP8.5 visar på störst ökning till slutet av seklet, upp mot 40 %, och ökningen är som störst i de inre delarna av länet. RCP4.5 visar på drygt 20% ökning till slutet av seklet. I och med ett varmare klimat kommer nederbörd som regn i stället för snö att bli allt vanligare vintertid.


5.3 Medelnederbörd vår

Observerat 1961-1990


Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Nederbörd (mm)






RCP4.5

RCP8.5



Förändring (%)

Förändring
2069-2098 vs 1961-1990


RCP4.5**RCP8.5**

Vårnederbörden är störst i fjällen, 140 mm, och i inlandet 112 mm för perioden 1961-1990. För länet totalsummeras vårnederbörden till 134 mm för perioden 1961-1990, men mellanårsvariationen är stor. I slutet av seklet väntas en ökning av vårnederbörden med ungefär 30 % enligt RCP4.5 och nära 50 % enligt RCP8.5. Liksom för vintersäsongen är ökningen störst i de inre delarna av länet.


5.4 Medelnederbörd sommar

Observerat 1961-1990


Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5



Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Sommaren är årstiden med störst nederbördsmängder i Västerbotten, i genomsnitt 218 mm under perioden 1961-1990 men mellanårsvariationen är stor. Enligt klimatscenarierna sker en svag ökning av sommarnederbörden fram till slutet av seklet. Ökningen är ungefär densamma för båda RCP-scenarierna fram till mitten av seklet men mot slutet på seklet är ökningen för RCP4.5 ungefär 20% medan den för RCP8.5 är ca 30%.


5.5 Medelnederbörd höst

Observerat 1961-1990


Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5



Förändring (%)





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Höstenederbörden i Västerbotten är i medeltal 201 mm för referensperioden 1961-1990 och mellanårsvariationen är stor. Fram till mitten på seklet ger de båda RCP-scenarierna mycket lika resultat, en ökning på ca 20 % väntas. RCP4.5 visar på en ökning med drygt 20% vid slutet av seklet, medan RCP8.5 visar en ökning på drygt 30 %. Störst är ökningen i fjällen


5.6 Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd

Observerat 1961-1990


Kartorna visar medelvärdet av varje års totala antal dagar då nederbörden överstiger 10 mm. Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5

RCP8.5




Antal dagar





Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Under referensperioden 1961-1990 uppmättes mer än 10 mm nederbörd på ett dygn, som genomsnitt över hela länet, 15 gånger på ett år. Västerbotten väntas få fler sådana tillfällen i framtiden, enligt RCP4.5 ökar antalet dagar med ca 7 och enligt RCP8.5 med ca 12. Ökningen är störst i fjällen.


5.7 Maximal dygnsnederbörd

Observerat 1961-1990


Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd. Resultaten presenteras som medelvärden över angiven period. Indexet är ett mått på risken för skyfall.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Det geografiska medelvärde av årets största dygnsnederbörd för perioden 1961-1990 är 29 mm, men enligt diagrammet varierar mängden mycket från år till år. Ett enskilt regn kan ge betydligt större regnmängder. Scenarierna visar på en tydlig ökning av maximala dygnsnederbörden, RCP8.5 ger en ökning på ca 25 % till slutet av seklet. RCP4.5 visar på en ökning på ca 15%. Den geografiska förekomsten av maximal dygnsnederbörd är störst i fjällen och i de sydliga delarna av länet.

5.8 Förändring av korttidsnederbörd

I föregående avsnitt har nederbörd analyserats utifrån dygnsvärden, både på års-, säsongs- och dygnsbasis. SMHI har även gjort studier av hur intensiv nederbörd kan förändras i framtiden.

Som underlag till Dricksvattenutredningen publicerades en rapport som bland annat innehåller kartor på Sverigeskala över så kallad framtida extrem korttidsnederbörd (Eklund m.fl., 2015). Baserat på den studien har nedanstående diagram framtagits för Västerbottens län över extrem nederbörd med 1-timmes varaktighet (figur 4). Diagrammen beskriver den procentuella ökningen av 1-timmesnederbörd för perioden 2069-2098 jämfört med referensperioden 1961-1990.

Resultatet presenteras för olika återkomsttider, ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Se ytterligare förklaring i Ordlistan.




Figur 4. Procentuell förändring av nederbörd med varaktigheten 1 timme mellan perioderna 2069-2098 och 1961-1990 för Västerbottens län. Punkterna representerar medianvärden och vertikala streck visar spridningen mellan de olika modellberäkningarna.

Den extrema 1-timmesnederbörden förväntas öka, och RCP8.5 visar på större förändring än RCP4.5. Ökningen är störst för de längre återkomsttiderna, dvs. de mer ovanliga extrema skurarna. Dock visar beräkningarna även på 15-25 % ökning för de årligen återkommande skurarna.

6 Total medeltillrinning

Avsnittet behandlar den totala tillrinningen dvs. det ackumulerade flödesbidraget från alla avrinningsområden som ligger uppströms, även utanför länsgränsen. Indexen kan vara av intresse för att bedöma vattentillgång till kraftproduktion och vattenuttag, samt för planering av markanvändning, som exploatering i områden kring sjöar och vattendrag. I Figur 5 är de utvalda vattendragen för analys av total tillrinning markerade med punkter. Gula områden används för analyser av lokal tillrinning, vilka redovisas i avsnitt 7.



Figur 5. Kartan visar avrinningsområden (röda linjer) och delområden enligt HBV-modellen (ljusgrå linjer). De markerade vattendragspunkterna relaterar till diagrammen över total tillrinning i rapporten. De gulmarkerade områdena avser beräkningarna för lokal tillrinning och markfuktighet. Västernorrlands län markeras med mörkgrå linje.

6.1 Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger


I diagrammen på följande sidor redovisas beräkningar av framtidens hydrologiska förhållanden avseende total tillrinning.

För länet beräknas en ökning av årstillrinningen med uppemot 10 % vid mitten av seklet. Av diagrammen framgår att tillrinningsökningen är ungefär densamma för RCP4.5 och RCP8.5 fram till mitten av seklet varefter skillnaden mellan RCP-scenarierna succesivt ökar. Ökningen är störst för RCP8.5 och vid slutet av seklet ligger medelökningen på omkring 30 % för RCP8.5 och 20 % för RCP4.5 men variationerna är stora.


Den största förändringen av totala tillrinningen sker för vinterperioden. För samtliga vattendrag ses en ökning. Ökningen är störst under andra halvan av seklet då också skillnaden mellan de båda RCP-scenarierna tydliggörs. Ökningen för RCP8.5 ligger vid slutet av seklet på upp över 100% för flertalet av älvarna.

Förändrad total årsmedeltillrinning


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälvens mynning




Umeälvens mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällbymagasinet




Förändrad total medeltillrinning vinter


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällebymagasinet




Förändrad total medeltillrinning vår


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällebymagasinet




Förändrad total medeltillrinning sommar


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällebymagasinet




Förändrad total medeltillrinning höst


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällebymagasinet




6.2 Förändrad total 10-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 10 år. Kartor och diagram ger en uppfattning om hur relativt vanliga höglöden kommer att öka eller minska och var det sker. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.




För total tillrinning med återkomsttid 10 år är de beräknade framtida förhållandena i länet lite blandade. Kartorna visar generellt på en minskning av 10-årsflödena i de sydöstra delarna av länet men inte helt entydigt. Diagrammen visar på en ökning eller ringa förändringen av 10-årsflödena i de flesta av älvarna och endast för Strömstad ses en något nedåtgående trend.


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällbymagasinet




6.3 Förändrad total 100-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år och kan vara till hjälp vid bedömningar av översvämningsrisker längs sjöar och vattendrag.




Kartorna uppvisar stora likheter med 10-årstillrinningen med minskande 100-årstillrinning för de sydöstra delarna av länet. Även diagrammen uppvisar samma utveckling som för 10-årstillrinningen med ökande eller oförändrad 100-årstillrinning för de flesta av älvarna.


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tångvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj



Åseleälven Hällbymagasinet




7 Lokalt medeltillrinning

Avsnittet behandlar den lokala tillrinningen, dvs. flödesbidraget från enbart det aktuella avrinningsområdet (utan bidrag från avrinningsområden som ligger uppströms). Detta ger en bild av hur mindre vattendrag vars vattenföring² enbart beror på lokala förhållanden, påverkas. Indexen kan användas för att se hur klimatförändringar förväntas förändra de lokala flödesmängderna, vilka bland annat påverkar förutsättningarna för liv i vattnet. Indexen kan även användas för att bedöma förändring av potentialen för kraftproduktion i mindre vattendrag.

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Diagram visas i detta avsnitt endast för två delavrinningsområden, Malgomaj i Åseleälven samt Skellefteälven nedre (se Figur 5).


7.1 Förändrad lokal årsmedeltillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning på årsbasis.




² Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag

Skellefteälven nedre






Åseleälven Malgomaj



Den lokala årsmedeltillrinningen ökar enligt scenarierna i hela länet. Det framgår även av diagrammen, som visar en ökad årlig tillrinning med ca 20-30 % i slutet av seklet för båda platserna. Ökningen är fram till mitten av seklet snarlik för båda scenarierna men mot slutet av seklet är ökningen större för RCP8.5 medans ökningen klingar av för RCP4.5

7.2 Förändrad lokal medeltillrinning vinter


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under vintern, här definierad som perioden december-februari.




Den största förändringen av lokala tillrinningen sker liksom för den totala tillrinningen under vinterperioden. Både för Skellefteälven nedre och Malgomaj följs scenarierna åt till mitten av seklet för att därefter skiljas åt. RCP8.5 visar en ökning med uppåt 80 % för Skellefteälven nedre och över 200 % för Malgomaj i Åseleälven vid slutet av seklet. RCP4.5 landar på 40 % för Skellefteälven nedre och 100 % för Malgomaj.

7.3 Förändrad lokal medeltillrinning vår


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under våren, här definierad som perioden mars-maj.



Skellefteälven nedre




Åseleälven Malgomaj




Den lokala tillrinningen under våren påverkas av förändrad snöförekomst i framtiden. De nordliga delarna av länet uppvisar ökad tillrinning medan de sydliga delarna ser ut att få mindre tillrinning. Diagrammen visar på en liten procentuell förändring för båda områdena.

7.4 Förändrad lokal medeltillrinning sommar


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under sommaren, här definierad som perioden juni-augusti.



Skellefteälven nedre




Åseleälven Malgomaj




För sommarperioden visar scenarierna inte på någon entydig förändring av tillrinningen i länet. Enligt kartorna så ser den generellt ut att öka i nordväst medan förändringen i övriga delar av länet varierar.

7.5 Förändrad lokal medeltillrinning höst


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under hösten, här definierad som perioden september-november.



Skellefteälven nedre




Åseleälven Malgomaj




För höstperioden kan ökad lokal tillrinning väntas för större delen av länet, dock inte lika stor som under vintern. Skellefteälven nedre uppvisar en ökning på 20-40 % vid slutet av seklet enligt scenarierna och i Malgomaj är ökningen ännu större.

7.6 Förändrad lokal 10-årstillrinning


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser lokal tillrinning med återkomsttid 10 år och visar hur relativt vanliga högflöden kommer att öka eller minska. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.



Skellefteälven nedre




Åseleälven Malgomaj




Liksom för den totala 10-årstillrinningen skiljer förändringen av den lokala 10-årstillrinningen sig åt mellan olika delar i länet. Mot slutet av seklet ser de sydostliga delarna av länet ut att få minskade 10-årsflöden och de nordöstliga ökande. De två utvalda områdena visar på en liten minskning men osäkerheten är stor och kan troligen kopplas till hur snötäcket utvecklas i de olika modellberäkningarna.

7.7 Förändrad lokal 100-årstillrinning


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser lokal tillrinning med återkomsttid 100 år och har intresse för utbredningskarteringar av översvämningar.



Skellefteälven mynning



Åseleälven Malgomaj



Kartorna uppvisar stora likheter med 10-årstillrinningen med minskande 100-årstillrinning för de sydöstra delarna av länet. Även diagrammen uppvisar samma utveckling som för 10-årstillrinningen med en viss minskning men med stor osäkerhet.

8 Tillrinningens årsdynamik

Tillrinningen varierar mellan år och under året beroende på hur nederbörd, temperatur, snötäcke, markfuktighet och avdunstning varierar och samspelar. För vattendragen ses dock vanligen en återkommande dynamik under året. Förändringar i årstidsförloppen kan ha stor betydelse för vattenförsörjning, miljö och biologisk mångfald, översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion.


I figurerna visas medelvärden för tillrinningens årsdynamik. Svart linje representerar referensperioden 1963-1992 och de två övriga linjerna representerar framtidsperioden 2069-2098. Blå linje avser medelvärden av beräkningar enligt RCP4.5 och röd linje representerar motsvarande för RCP8.5.

Samtliga vattendrag uppvisar tydliga årstidsförlopp för referensperioden, med vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Givetvis med variationer mellan de olika områdena och med variationer mellan åren.


Mönstret över årstidsförloppet kvarstår men framtidsscenarierna visar på tidigare vårflödestoppar, och högre vinter- och höstflöden. Förändringen av tillrinningen under sommaren är inte lika tydlig och varierar från område till område.

Tillrinningen under vår och höst ökar mer för RCP8.5 än RCP4.5 medan vårflödestoppen är mindre för RCP8.5 än för RCP4.5


Skellefteälven Strömfors




Skellefteälven mynning




Vindelälven Tängvattnet




Umeälven Storuman




Umeälven ovan Vindelälven




Vindelälven Tjulträsk




Vindelälven Storvindeln




Vindelälven Ruskträsk




Vindelälven mynning




Umeälven mynning



Åseleälven Malgomaj




Åseleälven Hällbymagasinet



9 Snö


9.1 Antal dagar med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll

Beräknat 1961-1990




I kartbilderna visas antal dagar med snötäcke med minst 5 mm vatteninnehåll. Det ger en uppfattning om hur länge marken är snötäckt i medeltal och kan vara av intresse för planering av infrastruktur, turism och friluftsanläggningar, rennärning, naturvårdsinsatser och miljöövervakning.


Beräknat 1961-1990




Beräknat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



Skellefteälven nedre



Malgomaj




Antalet dagar med snö varierar över länet. Från den snörika fjällregionen i nordväst till de mer snöfattiga sydöstliga delarna av länet. Vid slutet av seklet visar den sydöstliga delen på 20-80 dagar med snötäcke enligt RCP8.5 och 60-120 dagar med RCP4.5. Den nordvästra delen av länet visar på 180 till över 200 dagar med snötäcke beroende på scenario.

De två delavrinningsområdena visar på successivt minskande snötäcken. För det mer nordligt belägna Malgomaj minskar antalet dagar från drygt 200 till ca 160-180 vid slutet av seklet, beroende på scenario. Även för det sydligare belägna avrinningsområdet Skellefteälven nedre minskar antalet dagar och minskningen är här större.


9.2 Antal dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll

Beräknat 1961-1990




I kartbilderna visas antal dagar med snötäcke med minst 20 mm vatteninnehåll. Det kan tolkas som antal dagar då det är goda förhållanden för skidåkning. Kartorna ger en uppfattning om hur snöförhållandena för skidåkning förändras och kan därför användas för långsiktig planering av turism och friluftsanläggningar.


Beräknat 1961-1990




Beräknat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



Skellefteälvens nedre



Malgomaj




Liksom för föregående index ses att snöförhållandena varit sämre i medeltal perioden 1991-2013 jämfört med 1961-1990. Antalet dagar med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll minskar och har redan i mitten på seklet minskar till 60-120 dagar i de sydöstra delarna av länet. För de nordvästra delarna är det då fortfarande 180 till över 200 dagar i medeltal med snötäcke över 20 mm. Antal dagar minskar ytterligare till slutet av seklet och trenden är starkast för RCP8.5.


För det mer nordligt belägna Malgomaj minskar antalet dagar från drygt 170 till ca 110-150. För Skellefteälvens nedre sker en större förändring, från knappt 150 dagar i medeltal till 40-80 dagar vid slutet av seklet beroende på scenarie. Variationen mellan år kan dock vara stor.

9.3 Förändrat maximalt snötäcke


Indexet avser det maximala (största) snötäcket i termer av vatteninnehåll. Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet ger en uppfattning om hur mycket nederbörd som maximalt lagras i snötäcket under vintern. Det har betydelse för vattenflödena under våren och är av intresse för vattenkraftens reglering. Indexet kan också vara intressant avseende snölaster för konstruktioner.



Skellefteälven nedre




Malgomaj



Förändringen av det maximala snötäcket varierar över länet men i större delen av länet sker en minskning av det maximala snötäcket. Undantaget är den allra nordligaste delen där förhållandena ser ut att bli desamma eller enbart visar en liten ökning, beroende på scenario. Den procentuella minskningen är större för Skellefteälven nedre än för Malgomaj.

10 Markfuktighet

Beräknat 1961-1990




Antal dagar per år med låg markfuktighet. Indexet baseras på referensperiodens medelvärde av varje års lägsta markfuktighet. Indexet kan ha intresse för långtidsplanering av bevattningsbehov och grödval samt skogsbrandriskbedömning och skogsvårdsinsatser.


Beräknat 1961-1990




Beräknat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



Skellefteälven nedre



Malgomaj



Perioden 1991-2013 har haft fler dagar med låg markfuktighet jämfört med 1961-1990. Denna tendens fortsätter under seklet och de två RCP-scenarierna visar relativt stora skillnader vid seklets slut. Antal dagar med låg markfuktighet ökar generellt över hela länet men ökningens storlek varierar inom länet.

Avrinningsområdet Skellefteälven nedre har i dagens klimat drygt 10 dagar med låg markfuktighet. Antalet dagar ökar succesivt för framtidsscenarierna och vid slutet av seklet är antalet dagar ca 40-50 dagar beroende på scenario. Även i Malgomajs avrinningsområde ökar antalet dagar med låg markfuktighet men ökningen är mindre än för Skellefteälven nedre.

11 Slutsatser

Hur klimatet i Västerbottens län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen ser ut i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. I rapporten har beräkningar med två olika utvecklingsvägar analyserats fram till seklets slut. Scenariot RCP4.5 beskriver en framtid med kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar, men för scenariot RCP8.5 fortsätter utsläppen att öka.

Års**medeltemperaturen** i Västerbotten låg för perioden 1961-1990 på ca 0°C i fjällen och på drygt 2°C i lågterräng. Analyserna av framtida klimat visar en gradvis uppvärmning. I mitten på seklet visar båda RCP-scenarierna en uppvärmning på ca 3 grader jämfört med perioden 1961-1990. I slutet av seklet visar RCP4.5 en uppvärmning på drygt 3 grader medan RCP8.5 hamnar på ca 6 grader. Störst uppvärmning väntas ske under vintern, med upp mot 7 grader enligt RCP8.5.

I och med uppvärmningen ökar **vegetationsperiodens** längd, för RCP4.5 med ungefär en månad och för RCP8.5 ca 50 dagar. **Värmeböljorna** förväntas också öka då antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på ca 8 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

En varmare atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation vilket ger mer nederbörd. Analyserna av års**medelnederbörd** bekräftar större regnmängder i det framtida klimatet. Årsmedelnederbörden väntas öka med ca 20 % för RCP4.5 och nära 40 % för RCP8.5. Nederbörden ökar mest under våren där RCP8.5 visar på en 50 % ökning i vissa områden. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15- 25 % beroende på RCP-scenario.

För länet ses en ökning av totala år**stillrinningen** med uppemot 10 % vid mitten av seklet och ökningen fortsätter mot slutet av seklet. Den största ökningen av tillrinningen sker för vintern och RCP8.5 visar där på en ökning mellan 70-200 % för vattendragen. Även under våren ökar tillrinningen i vattendragen medan den minskar för samtliga vattendrag undantaget Strömfors under sommaren.

Total tillrinning med **återkomsttid** 10 år respektive 100 år ser ut att minska nästan överallt i de sydostliga delarna av länet medan en viss ökning ses för fjällregionen. För de utvalda älvarna uppvisar diagrammen en ökad eller oförändrad total 10-årstillrinning och 100-årstillrinning.

Vattendragen har under referensperioden haft tydliga **årstidsförlopp**, med vårflodestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Mönstret för årstidsförloppet kvarstår men framtidsscenarierna visar på tidigare vårflodestopp, och högre vinter- och höstflöden. Förändringen av tillrinningen under sommaren är inte lika tydlig och varierar från område till område.

Antalet dagar med **snö** varierar över länet. Enligt klimatscenarierna minskar snötäcket generellt i länet och trenden är starkast för RCP8.5. Antalet dagar med låg **markfuktighet** ökar i framtiden. Från dagens 5-15dagar till 20-40 dagar (RCP4.5) eller 25-50 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Beskrivningen baseras på medelförhållanden men det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

12 Tackord

Förutom rapportförfattarna har även Kristoffer Hallberg, Joel Dahné och Johan Andréasson bidragit till rapporten. Tack också till alla som deltog i arbetet med nedskalning av RCP-scenarierna.

13 Referenser

- Eklund A., Axén-Mårtensson J., Bergström S., Björck E., Dahné J., Lindström L., Nordborg D., Olsson J., Simonsson L. och Sjökvist E. 2015. Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattenutredningen. SMHI Klimatologi Nr 14.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-framtida-klimat-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.89524>
- ICONICS, 2013. Nakićenović N., Lempert R., and Janetos A (eds.). A Special Issue of Climatic Change journal on the Framework for the Development of New Socioeconomic Scenarios for Climate Change Research. <https://www2.cgd.ucar.edu/research/iconics/publications/ssps>
- IPCC 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Nougier, M., van der Linden, P.J. Dai, X., Maskell, K. and Johnson, C.A. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881 pp. http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
- IPCC 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html
- IPCC 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>
- Nakićenović N., and R. Swart (eds.) 2000. Special Report on Emissions Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 599 pp.
<https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf>
- Persson G., Strandberg G. och Berg P. 2015. Vägledning för användande av klimatscenarier. SMHI Klimatologi Nr 11. <http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier>
- Persson G., Ohlsson A., Sjökvist E., Asp M., Dahné J. och Eklund D. 2013. Klimatanalys för Dalarnas län, SMHI rapport Nr 2013-70.
- Sjökvist E., Axén Mårtensson J., Dahné J., Köplin N., Björck E., Nylén L., Berglöv G., Tengdelius Brunell J., Nordborg D., Hallberg K., Södling J. och Berggreen-Clausen S. 2015. Klimatscenarier för Sverige – Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier. SMHI Klimatologi Nr 15.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/klimatscenarier-for-sverige-bearbetning-av-rcp-scenarier-for-meteorologiska-och-hydrologiska-effektstudier-1.87248>

SMHIs publiceringar

SMHI ger ut sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket.

Seriernas namn	Publiceras sedan
RMK (Report Meteorology and Climatology)	1974
RH (Report Hydrology)	1990
RO (Report Oceanography)	1986
METEOROLOGI	1985
HYDROLOGI	1985
OCEANOGRAFI	1985
KLIMATOLOGI	2009

I serien KLIMATOLOGI har tidigare utgivits:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 Lotta Andersson, Julie Wilk, Phil Graham, Michele Warburton (University KwaZulu Natal) (2009) Local Assessment of Vulnerability to Climate Change Impacts on Water Resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for Adaptation2 Gunn Persson, Markku Rummukainen (2010) Klimatförändringarnas effekter på svenskt miljömålsarbete3 Jonas Olsson, Joel Dahné, Jonas German, Bo Westergren, Mathias von Scherling, Lena Kjellson, Fredrik Ohls, Alf Olsson (2010) En studie av framtida flödesbelastning på Stockholms huvudavloppssystem4 Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar, Joakim Langner, Ralf Döscher, Henrik Smith (2011) Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet. En översyn av natur-vetenskapliga aspekter5 Sten Bergström (2012) Framtidens havsnivåer i ett hundraårsperspektiv – kunskapssammanställning 20126 Jonas Olsson och Kean Foster (2013) Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige | <ol style="list-style-type: none">7 FN:s klimatpanel – Sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet. Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2014)8 Att begränsa klimatförändringar (2014) (Ej publicerad)9. Erik Kjellström SMHI. Reino Abrahamsson, Pelle Boberg. Eva Jernbäcker Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI (2014) Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget10. Risker och konsekvenser för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt (2014)11. Gunn Persson (2015) Vägledning för användande av klimatscenarier12 Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius (2015) Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat13. Gunn Persson (2015) Sveriges klimat 1860-2014. Underlag till Dricksvattenutredningen. |
|---|--|

14. Anna Eklund (2015)
Sveriges framtida klimat. Underlag till
Dricksvattensutredningen.
15. Elin Sjökvist, Jenny Axén Mårtensson,
Joel Dahné, Nina Köplin, Emil Björck,
Linda Nylén, Gitte Berglöv, Johanna
Tengdelius Brunell, Daniel Nordborg,
Kristoffer Hallberg, Johan Södling,
Steve Berggreen-Clausen (2015)
Klimatscenarioer för Sverige -
Bearbetning av RCP-scenarioer för
meteorologiska och hydrologiska
effektstudier
16. Elin Sjökvist, Gunn Persson, Jenny
Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra
Ohlsson och Håkan Persson (2015)
Framtidsklimat i Dalarnas län – enligt
RCP-scenarioer.
17. Linda Nylén, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson,
Alexandra Ohlsson, Håkan Persson,
Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Värmlands län –
enligt RCP-scenarioer.
18. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson,
Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Örebro län – enligt
RCP-scenarioer.
19. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp,
Steve Berggreen-Clausen, Gitte
Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell,
Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västmanlands län –
enligt RCP-scenarioer.
20. Elin Sjökvist, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Anna Johnell, Jenny
Axén Mårtensson, Linda Nylén,
Alexandra Ohlsson, Håkan Persson,
(2015) Framtidsklimat i Uppsala län –
enligt RCP-scenarioer.
21. Magnus Asp, Steve Berggreen-
Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck,
Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson,
Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Stockholms län –
enligt RCP-scenarioer.
22. Magnus Asp, Steve Berggreen-
Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck,
Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson,
Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Södermanlands län –
enligt RCP-scenarioer.
23. Magnus Asp, Steve Berggreen-
Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck,
Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson,
Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Östergötlands län –
enligt RCP-scenarioer.
24. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Emil Björck,
Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén,
Alexandra Ohlsson, Håkan Persson,
Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västra Götalands län
– enligt RCP-scenarioer.
25. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp,
Steve Berggreen-Clausen, Gitte
Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell,
Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Jönköpings län –
enligt RCP-scenarioer.
- Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Anna Johnell, Jenny
Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan
Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Jönköpings län –
enligt RCP-scenarioer.
26. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv,
Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson,
Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,
Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Kalmar län – enligt
RCP-scenarioer.
27. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve
Berggreen-Clausen, Emil Björck,
Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén,
Alexandra Ohlsson, Håkan Persson,
Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Kronobergs län –
Enligt RCP-scenarioer.

28. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Hallands län – enligt RCP-scenarier.
29. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Skåne län – enligt RCP-scenarier.
30. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier.
31. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier.
32. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Norrbottens län – enligt RCP-scenarier.



Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

ISSN 1654-2258