


Framtidsklimat i Jönköpings län

– enligt RCP-scenarier

Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist



Pärmbilden visar den beräknade maximala dygnsnederbörden vid slutet av seklet enligt RCP8.5.

KLIMATOLOGI Nr 25, 2015

Framtidsklimat i Jönköpings län

– enligt RCP-scenarier

Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist

Sammanfattning

Hur klimatet i Jönköpings län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jönköping baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Geografiskt detaljerade klimatdata har framtagits och använts för hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av modelldata.

Temperaturen för Jönköpings län beräknas öka med ca 3 grader enligt RCP4.5 till slutet av seklet jämfört med perioden 1961-1990 och knappt 5 grader enligt RCP8.5. Den största temperaturökningen sker under vintern och sommaren med uppemot 5 grader under båda årstiderna enligt RCP8.5. Vegetationsperioden blir ca 40-70 dagar längre och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 13 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med 10-20 %. Nederbörden ökar mest vintertid, i sydvästra delen av länet visar RCP8.5 på nästan 50 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 20 %.

För länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot 5 % vid slutet av seklet. Den största ökningen av tillrinningen sker för vintern och även det lägre scenariot RCP4.5 visar på 15-35 % för vattendragen. För sommaren ses minskad tillrinning för vattendragen.

Höga tillrinningar med återkomsttid 10 år respektive 100 år ser ut att öka i delar av länet. Det förekommer även delar av länet som uppvisar en minskning av höga tillrinningar.

Flöden i vattendragen har under referensperioden tydliga årstidsförlopp, med vårflödestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Dessa förändras enligt framtidsscenarierna som visar på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit. En längre säsong med låga flöden kan också förväntas.

Antalet dagar då tillrinningen är låg ökar från ca 20 dagar till 30-40 dagar (RCP4.5) respektive ca 50-60 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Från dagens 15 dagar till 30 dagar (RCP4.5) respektive 50 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Summary

The report describes today's and future climate in Jönköping County based on observations and climate modelling. Regional modelled RCP4.5 and RCP8.5 scenarios have been further downscaled to 4×4 km² resolution. The results are presented as meteorological and hydrological indices based on statistically processed model data.

Ordlista

Avrinningsområde	Det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid en angiven plats.
DBS-metoden	"Distribution Based Scaling" är ett verktyg för att korrigera klimatmodellernas utdata så att de kan användas som indata till hydrologisk modellering. Med DBS-skalering fås en högre rumslig upplösning av data.
Flöde	Här avses vattenflöde dvs. hur mycket vatten som rinner i vattendragen.
Global klimatmodell (GCM)	På engelska "Global Circulation Model" eller "Global Climate Model". En global klimatmodell beskriver hela jordklotet och de processer som sker i atmosfären, havet, havsisen och marken.
Gridbox	I en klimatmodell delas atmosfären upp i tredimensionella lådor, så kallade gridboxar. I varje gridbox räknas alla klimatologiska variabler ut som beskriver klimatet i den boxen.
HBV	En hydrologisk modell som beräknar markfuktighet, snöackumulation, snösmältning, avdunstning och avrinning/tillrinning samt beskriver vattnets väg i avrinningsområdet.
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change. Även benämnd FN:s klimatpanel.
Klimatindex	Bearbetade utdata från klimatmodeller. De kan beskriva medelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden.
Klimatscenario	En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser, en global och en regional klimatmodell.
Osäkerhet	Det finns olika källor till osäkerheter i frågan om framtidens klimat. Den största osäkerheten ligger i hur mycket växthusgaser människan kommer släppa ut i framtiden. Det finns även osäkerheter i klimatmodellerna, t.ex. beroende på begränsad upplösning i både tid och rum.
RCA	Rosby Centre Regional Climate model (RCA) är en regional klimatmodell som utvecklas och används av SMHI:s klimatforskningsgrupp.
RCP	RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet "representativa koncentrationsutvecklingsbanor" från engelskans "Representative Concentration Pathways (RCP)". RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i W/m^2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013.
Referensperiod	SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att definiera dagens klimat. Nya observationer jämförs med medelvärdet för 1961-1990 för att säga hur de avviker från det normala. Meteorologiska världsorganisationen, WMO, definierar referensperioderna och nästa period blir 1991-2020.
Regional klimatmodell (RCM)	Beskriver klimatet för en del av jordklotet, en region. En regional klimatmodell använder alltid indata från en global klimatmodell.
SRES	Scenarier som beskriver framtida utsläpp av växthusgaser, baserade på antaganden om den framtida utvecklingen av världen. SRES-scenarier användes i de beräkningar av

	framtidens klimat som låg till grund för arbetet med IPCC:s rapporter från år 2000 och 2007. SRES= Special Report on Emission Scenarios.
Strålningsdrivning	Strålningsdrivningen är skillnaden mellan hur mycket energi solstrålningen som träffar jorden innehåller och hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden igen. Denna energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m ² . Strålningsdrivningen ökar då mängden växthusgaser ökar i atmosfären, vilket resulterar i en global ökning av temperaturen på jorden. För att studera framtida klimat finns ett antal strålningsdrivningsscenarier att utgå ifrån, se "RCP".
Trend	Här används begreppet som "en förändring över tid".
Upplösning	Upplösningen är storleken på gridboxarna i klimatmodellen. Låg upplösning (stora gridboxar) ger mindre detaljerad information, men kostar mindre datorkraft. Hög upplösning (små gridboxar) ger mer detaljerad information, men kostar mer datorkraft.
Variabilitet	Variabilitet är en viktig faktor inom klimatologin. Klimatet är inte bara genomsnittliga värden utan klimat kännetecknas av variationer i tid och rum som kan hänga ihop med till exempel växelverkan mellan atmosfären och havet.
Växthusgaser	Atmosfären som omger jorden har förmågan att bevara energin från solen så att jordytan blir varmare än vad den skulle varit om atmosfären inte fanns. Den s.k. naturliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av en viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären. Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna. Atmosfärens sammansättning har sedan den förindustriella tiden successivt förändrats på grund av mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon, men även en rad industrigaser spelar roll.
Återkomsttid	Ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Ett värde som har en återkomsttid på 100 år uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år. Det innebär att sannolikheten är en (1) procent varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större. För en konstruktion vars livslängd beräknas till 100 år blir den ackumulerade risken hela 63 % att 100-årsvärdet överskrids någon gång under 100 år. Om säkerhetsnivån väljs till 100-årsvärdet är risken att det värdet överskrids större än att det underskrids. Det är alltså troligare att konstruktionen, under sin livslängd, kommer att utsättas för förhållanden utöver den nivå som valts än att den nivån aldrig inträffar. För 10-årsvärdet är sannolikheten 65 % att det överskrids någon gång under 10 år.

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	1
2	BAKGRUND	1
3	METOD OCH PRESENTATION	1
3.1	Antaganden, modeller och databearbetning.....	1
3.2	Osäkerheter	2
3.3	Generella resultat för Sverige	3
3.4	Jämförelse SRES-RCP.....	3
3.5	Läsanvisningar.....	5
3.5.1	Kartor	5
3.5.2	Diagram	5
4	TEMPERATUR	7
4.1	Årsmedeltemperatur	7
4.2	Medeltemperatur vinter.....	9
4.3	Medeltemperatur vår	11
4.4	Medeltemperatur sommar	13
4.5	Medeltemperatur höst.....	15
4.6	Vegetationsperiodens längd	17
4.7	Vegetationsperiodens starttidpunkt	19
4.8	Värmebölja.....	21
4.9	Graddagar för uppvärmning.....	23
4.10	Graddagar för kylning.....	25
5	NEDERBÖRD	27
5.1	Årsmedelnederbörd	27
5.2	Medelnederbörd vinter.....	29
5.3	Medelnederbörd vår	31
5.4	Medelnederbörd sommar	33
5.5	Medelnederbörd höst.....	35
5.6	Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd.....	37
5.7	Maximal dygnsnederbörd.....	39
5.8	Maximal 7-dygnsnederbörd.....	41
5.9	Förändring av korttidsnederbörd.....	43
6	TOTAL MEDELTILLRINNING	44
6.1	Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger.....	44
6.2	Förändrad total 10-årstillrinning	51
6.3	Förändrad total 100-årstillrinning	53

7	LOKAL MEDELTILLRINNING.....	55
7.1	Förändrad lokal årsmedeltillrinning.....	55
7.2	Förändrad lokal medeltillrinning vinter	57
7.3	Förändrad lokal medeltillrinning vår.....	58
7.4	Förändrad lokal medeltillrinning sommar	59
7.5	Förändrad lokal medeltillrinning höst	60
7.6	Antal dagar med lågflöde	61
8	TILLRINNINGENS ÅRSDYNAMIK	63
9	MARKFUKTIGHET	65
10	SLUTSATSER	67
11	TACKORD	67
12	REFERENSER	68

1 Inledning

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jönköping baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, dvs. medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av data.

2 Bakgrund

FN:s klimatpanel presenterade 2013 en ny rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013). Resultaten baserades på nya möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). SMHI fick 2014 i uppdrag av regeringen att göra en enhetlig studie för Sverige baserad på dessa scenarier. Studien finansierades via det klimatanpassningsanslag som tilldelades Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Arbetet resulterade i databasen SCID med statistik i form av klimatindex för Sveriges nutida och framtida klimat. Databasen, tillsammans med en rapport och beskrivande dokument, finns tillgänglig som en nedladdningstjänst på smhi.se. Rapporten "Klimatscenarier för Sverige" beskriver metoder, resultat och osäkerheter, vilket är viktigt att ha kunskaper om vid studier av framtida klimat på läns- och kommunnivå (Sjörqvist m.fl., 2015).

I regleringsbrevet för 2015 avseende klimatanpassningsanslaget gavs SMHI i uppdrag att ta fram länsvisa enhetliga klimatanalyser baserade på de nya klimatscenierna. Den ovan nämnda databasen är utgångspunkten för analyserna i föreliggande rapport som avser Jönköpings län.

SMHI har tidigare levererat en klimatanalys på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping (Andréasson m.fl., 2011). Den baseras på äldre klimatscenarier och behandlar framtida temperatur, nederbörd och snö. Rapporten innehåller också en beskrivning av Jönköpings nutidsklimat.

3 Metod och presentation

I detta kapitel beskrivs metodiken mycket kortfattat. Mer information finns i rapporten "Klimatscenarier för Sverige" som nämns ovan. På smhi.se finns också en "Vägledning klimatscenarier" som stöd för användande av klimatscenarier (Persson m.fl., 2015). I Ordlistan finns flertalet begrepp definierade.

3.1 Antaganden, modeller och databearbetning

Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser förändras. För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som slår in beror på människans förmåga att begränsa utsläppen. RCP-scenarierna beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till år 2100. I följande analyser används två RCP-scenarier, RCP4.5 som bygger på begränsade utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp. Tabell 1 beskriver vilka antaganden som ligger till grund för scenarierna.

Forskarvärlden har fokuserat på dessa två scenarier, därför finns det mest fullständiga underlaget för dessa i form av regionala klimatberäkningar. Det är skälet till att dessa två scenarier använts i föreliggande rapport. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd vad avser framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.


Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för scenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

RCP4.5	RCP8.5
• Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring år 2040 • Befolkningsmängd något under 9 miljarder i slutet av seklet • Lågt arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster • Omfattande skogsplanteringsprogram • Låg energiintensitet • Kraftfull klimatpolitik	• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar kraftigt • Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion • Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt • Stort beroende av fossila bränslen • Hög energiintensitet • Ingen tillkommande klimatpolitik

För att göra beräkningar av det framtida klimatet krävs klimatmodeller, de är matematiskt formulerade beskrivningar av de fysikaliska processerna i klimatsystemet. De globala klimatmodellerna beskriver hela jorden och de regionala beskriver mer förfinat ett delområde. Indelningen sker i så kallade gridboxar, ett 3-dimensionellt rutnät av atmosfären. Det är mycket omfattande beräkningar som sker på superdatorer.

Den globala klimatmodelleringen görs med en relativt grov upplösning, vilket betyder att storleken på rutorna vid jordytan kan vara ca $200 \times 200 \text{ km}^2$. Den regionala klimatmodelleringen utförs med högre upplösning, ca $50 \times 50 \text{ km}^2$, och ger därför mer detaljerade beräkningar. I analysen ingår nio olika globala klimatmodeller från olika institut runt om i världen. Rossby Centre vid SMHI har utfört regional modellering med den regionala klimatmodellen RCA4.

För att utföra analyser på lokal skala, exempelvis för hydrologiska beräkningar, krävs data med ännu högre geografisk upplösning. SMHI har därför utvecklat en metod, DBS (Distribution Based Scaling), för att öka upplösningen till $4 \times 4 \text{ km}^2$. Därefter har hydrologisk modellering utförts med HBV-modellen. Flödesberäkningar baseras på oregrerade förhållanden.



Statistik har beräknats i form av klimatindex, vilka är definierade i respektive avsnitt. Varje enskilt modellresultat har bearbetats separat men resultaten presenteras sammanlagda för RCP4.5 och RCP8.5. De index som berör temperatur och nederbörd, presenteras med $4 \times 4 \text{ km}^2$ upplösning. De hydrologiska indexen, som berör tillrinning och markfuktighet, presenteras för avrinningsområden. Beräkningar av korttidsnederbörd (avsnitt 5.89) är utförd direkt på regional klimatdata.

3.2 Osäkerheter

Ett klimatscenario kräver en lång kedja av beräkningar och antaganden. Det finns alltså flera källor till osäkerheter; klimatets naturliga variationer, val av klimatmodell och framtida utsläpp av växthusgaser.

Den naturliga variationen innebär att klimatet varierar naturligt från år till år. Denna osäkerhet påverkar mest klimatscenarioer för en nära framtid, eftersom klimatet inte hunnit förändras så mycket. Klimatförändringen är då svår att urskilja från den naturliga variationen i klimatet.

Alla klimatmodeller baseras på samma grundläggande kunskap om klimatsystemet och fungerar på ungefär samma sätt. Resultaten skiljer sig ändå åt beroende på att processerna i klimatsystemet kan beskrivas på olika sätt, och att fler eller färre processer inkluderas i modellerna. Ingen modell är perfekt, därför är det bra att sammanväga resultaten från olika modeller. Det ger ett mått på hur stor betydelse olika modellbeskrivningar har för det beräknade klimatet.

Framtidens klimat beror på framtida utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt resultat, som kan utläsas i klimatscenarierna, är att valet av RCP-scenario har mycket liten betydelse för de närmsta årtiondena. Mot mitten på seklet börjar valet av RCP-scenario växa i betydelse för klimatets utveckling.

3.3 Generella resultat för Sverige

I figur 1 och 2 visas översiktliga beräkningar av framtidens förändringar av temperatur och nederbörd i Sverige. Där redovisas även tidigare resultat baserade på s.k. SRES-scenarier. Skillnaderna kommenteras mer utförligt i kapitel 3.4.

Årsmedeltemperaturen beräknas öka för hela Sverige i framtiden. RCP8.5 visar generellt på störst uppvärmning (4-6 grader). RCP4.5 visar på samma mönster men en lägre uppvärmning (2-4 grader).

Nederbörden beräknas öka i framtiden. RCP8.5 visar störst förändring, särskilt i norra Sverige, där ökningen beräknats till 30-50 %. RCP4.5 visar samma förändringsmönster, men som mest 30 % ökning (i Lapplandsfjällen).

Medeltillrinningen väntas öka i hela landet utom i sydöstra Sverige, där det sker en minskning. Störst ökning sker i landets norra delar. RCP8.5 ger det mest extrema resultatet både där tillrinningen ökar och där den minskar.


Extrema vattenflöden, redovisade som 100-årsflöden¹, beräknas öka i vattendragen i södra Sverige mot slutet av seklet. I de nordliga älvarna är förändringen mindre tydlig och kan till och med medföra en minskning av de extrema flödena.

3.4 Jämförelse SRES-RCP


Klimatforskningen utvecklas hela tiden, nya resultat publiceras, liksom nya sätt att beskriva antaganden om framtida utsläpp. I FN:s klimatpanels tredje och fjärde stora sammanställning (IPCC, 2001 och IPCC, 2007) användes scenarierna SRES (Special Report on Emission Scenarios) (Nakićenović and Swart (eds.) 2000). I femte sammanställningen AR5 (IPCC, 2013) antogs de nya scenarierna RCP (Representative Concentration Pathways) (ICONICS, 2013).

I de tidigare länsanalyser som utförts av SMHI baseras resultaten på 16 SRES-scenarier med tyngdpunkt på utsläppsscenario A1B. För att få en uppfattning om hur dessa skiljer sig från de nya RCP-scenarierna visas här kartor på förändringen i temperatur för perioden 2069-2098 jämfört med 1961-1990 (figur 1).

Alla scenarier visar på en tydlig uppvärmning i hela landet och störst uppvärmning i norra Sverige. SRES-scenarierna har inte lika tydlig gradient mellan norra och södra Sverige som RCP-scenarierna. Uppvärmningen är generellt något lägre än i RCP8.5, men utmärkande för SRES-scenarierna är hög uppvärmning längs kusterna, framförallt norra Norrlandskusten. Det beror med stor sannolikhet på dataunderlaget till SRES-analysen, då temperaturdata längs kusten påverkades mycket av havsklimatet, vilket kan ge missvisande resultat. De höga värdena längs kusterna i SRES-kartan bör alltså tolkas med försiktighet.



Figur 1. Beräknad förändring av årsmedeltemperatur för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.



Figur 2. Beräknad procentuell förändring av årsnederbörden för perioden 2069-2098 jämfört med perioden 1961-1990, enligt de tidigare beräkningarna med SRES och de nyare med RCP4.5 respektive RCP8.5. Värdena i kartorna är utjämnade för att förenkla tolkningen.

Kartorna i figur 2 visar förändringen i årsmedelnederbörd vid slutet på seklet jämfört med perioden 1961-1990. SRES-scenarierna är mycket lika RCP4.5, med en ökning på 10-30 %.

Skillnaderna är alltså olika beroende på vilken variabel som studeras och beror till stora delar på de klimatmodeller som använts i beräkningarna. För SRES-analyserna användes 16 olika uppsättningar av globala och regionala modeller, medan RCP-analyserna är baserade på nio olika globala modeller och en regional (RCA4). Det ger en bättre representation avseende globala beräkningar men i analysen har endast data från en regional modell varit tillgänglig, vilket kan ge ett snävt resultat. RCA4 har visat sig vara något blötare i jämförelse med andra regionala modeller, vilket betyder att samma RCP-scenarier kan uppvisa något torrare klimatförändring med andra kombinationer av globala och regionala modeller.

3.5 Läsanvisningar

På följande sidor presenteras index baserade på temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. Indexen beskrivs och resultaten presenteras i korta texter i respektive kapitel. Indexen presenteras lite olika vad gäller kartor och diagram, vilket beskrivs nedan.

3.5.1 Kartor

För temperatur- och nederbördsindex visas observerade och beräknade värden. För medeltemperatur och medelnederbörd samt antal dagar med mer än 10 mm nederbörd visas även kartor över förändringar mellan tidsperioder.

För index baserade på tillrinning presenteras endast förändringar mellan tidsperioder. Förändringar anges som procentuell avvikelse från referensperioden.

Alla kartor visar medelvärden över en given tidsperiod. I de kartor som visar förändringar mellan tidsperioder är värdena geografiskt utjämnade för att underlätta tolkningen.

Sverigekartorna representerar respektive index för referensperioden 1961-1990 och visar hur förhållandena i länet relaterar till övriga Sverige.


3.5.2 Diagram

Diagrammen för temperatur och nederbörd visar utvecklingen över tid för länet som helhet jämfört med referensperioden 1961-1990. Tillrinning och markfuktighet är beräknade utifrån hydrologisk modellering och diagrammen för de indexen visar utvecklingen över tid för ett definierat avrinningsområde, jämfört med referensperioden 1963-1992.

Diagram för temperatur och nederbörd innehåller staplar med observationer som är geografiska medelvärden för hela länet, se förklaring av diagrammets uppbyggnad i figur 3. För tillrinning och markfuktighet finns inte motsvarande observerade värden att tillgå, därför saknar de diagrammen observationsstaplar.

Tillrinningens årsdynamik presenteras som 30-årsmedelvärden för referensperioden 1963-1992 och framtidsperioden 2069-2098.

Diagrammen över förändring av korttidsnederbörd avser länet som helhet.




Figur 3. Beskrivning av diagrammens struktur i rapporten.

4 Temperatur


4.1 Årsmedeltemperatur

Observerat 1961-1990




Årsmedeltemperatur är medelvärdet av varje års medeltemperatur beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur. Det är tillsammans med årsmedelnederbörd det mest använda indexet för att beskriva klimatet.

Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Temperatur (°C)




RCP4.5



RCP8.5



SMHI



SMHI




Under perioden 1961-1990 var årsmedeltemperaturen för hela Jönköpings län 5,6°C. Det förekommer en del variationer i länet, på höglandet är det knappt 5°C men närmast Vättern är det drygt 6°C. Under de senaste drygt 20 åren har temperaturen stigit med nästan 1°C runt om i länet och trenden att det blir varmare är tydlig i båda klimatscenarierna. I mitten av seklet, perioden 2021-2050, är resultaten från de båda RCP-scenarierna mycket lika, skillnaderna tydliggörs först under andra hälften av seklet.

I diagrammet visas förändringen över länet som helhet för de två RCP-scenarierna, årsvärden av observerad medeltemperatur för Jönköpings län är markerade som staplar. Staplarna visar att årsmedeltemperaturen i länet kan variera med ca 3°C. Denna mellanårsvariation består även i framtiden, vilket framgår av de skuggade fälten i diagrammet. De heldragna linjerna visar 30-års löpande medelvärde av scenarierna för att förtydliga trender. Temperaturen väntas stiga med flera grader till slutet av seklet jämfört med referensperioden; enligt RCP4.5 med ca 3 grader medan RCP8.5 visar på en knappt 5-gradig ökning. Runt Vättern hamnar årsmedeltemperaturen på närmare 11°C och på höglandet 8-9°C.


4.2 Medeltemperatur vinter

Observerat 1961-1990

Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärden för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Temperatur (°C)




RCP4.5



RCP8.5



SMHI



SMHI




Jönköpings vintermedeltemperatur var under referensperioden 1961-1990 $-2,9^{\circ}\text{C}$. Vintrarna har blivit mildare under de senaste 23 åren. Staplarna visar generellt mildare vintrar men tidvis kan enstaka, kallare vintrar förekomma. De två olika scenarierna visar samstämmigt på att det blir mildare vintrar framöver. Enligt RCP4.5 blir det 3 grader varmare till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar 5 graders skillnad mot referensperioden 1961-1990.


4.3 Medeltemperatur vår

Observerat 1961-1990

Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Temperatur (°C)




RCP4.5



RCP8.5



SMHI



SMHI




Medeltemperaturen för våren under perioden 1961-1990 var 4,4°C, och mellanårsvariationen är betydligt mindre jämfört med vintern. De senaste drygt 20 åren har medeltemperaturen ökat med knappt 1 grad och trenden håller i sig under resten av århundradet. Den största ökningen sker enligt både RCP4.5 och RCP8.5 i länets östra del. Enligt RCP4.5 blir det en 2-3 gradig temperaturökning medan RCP8.5 visar på mellan 4 och 5 graders ökning jämfört med 1961-1990.


4.4 Medeltemperatur sommar

Observerat 1961-1990


Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098





Temperatur (°C)




RCP4.5

RCP8.5




Förändring (°C)





**Förändring
2069-2098 vs 1961-1990**

RCP4.5



RCP8.5




Sommarmedeltemperaturen under 1961-1990 var 14,5°C. Sommaren är svalast på höglandet där temperaturen låg på 12-13°C i medeltal under referensperioden, medan det på övriga håll i länet var någon grad varmare. Under perioden 1991-2013 steg temperaturen allmänt med knappt 1 grad och den här trenden håller i sig. Enligt RCP4.5 stiger temperaturen till slutet av seklet med 3 grader jämfört med referensperioden, medan RCP8.5 visar på en 5-gradig temperaturökning.


4.5 Medeltemperatur höst

Observerat 1961-1990

Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet för respektive period beräknat utifrån dygnsmedeltemperatur.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Temperatur (°C)




RCP4.5



RCP8.5



SMHI



SMHI



Medeltemperaturen för hösten låg på 6,3°C under 1961- 1990 för att stiga knappt 1 grad under perioden 1991 och 2013. Trenden med mildare höst håller i sig och fram till slutet av seklet har det blivit 2-4 grader varmare i hela länet. Den största ökningen väntas i östra delen av länet.


Allmänt om årstiderna

Både RCP4.5 och RCP8.5 visar på en temperaturökning för alla årstiderna fram till slutet av seklet. Temperaturökningen kan indikera, om medeltemperaturer används för att definiera årstiderna, att hösten håller i sig längre och att våren kommer tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare och sommaren längre.

Den största temperaturökningen sker under vinter- och sommarmånaderna. För båda årstiderna visar RCP4.5 på en ökning med 3 grader till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar på knappt 5 graders ökning jämfört med referensperioden 1961-1990. Den största skillnaden väntas i östra delen av länet.


4.6 Vegetationsperiodens längd

Observerat 1961-1990




Längden på vegetationsperioden är definierad som skillnaden mellan sluttidpunkt och starttidpunkt. Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning.

Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



SMHI



SMHI




Längden på vegetationsperioden¹ under perioden 1961-1990 för länet som helhet var 204 dagar (ca 7 månader). På höglandet är vegetationsperioden runt 190 och närmast Vättern ligger vegetationsperioden på ca 220 dagar, då Vättern bidrar till lite mildare vår och höst. Under de senaste dryga 20 åren har vegetationsperioden ökat med ungefär 1 vecka i stora delar av länet.

Klimatscenarioerna visar tydligt att vegetationsperioden kan bli längre under de kommande årtiondena. Fram mot slutet av århundrandet visar RCP4.5 på en ökning med generellt 6 veckor över hela länet. Temperaturen i scenario RCP8.5 är lite varmare än RCP4.5 under våren och hösten och detta syns tydligt på vegetationsperioden. Mellan de två scenarierna skiljer det ungefär 4 veckor. På Höglandet sträcker sig vegetationsperioden i slutet av seklet enligt RCP8.5 upp till 8 månader. I sydvästra delen av länet samt runt Vättern beräknas vegetationsperioden sträcka sig upp mot 300 dagar, det vill säga vegetationsperioden kan mot slutet av seklet täcka in nästan 10 månader av året på en del håll i länet.

¹ Vegetationsperioden definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett visst gränsvärde, som varierar för olika tillämpningar men ligger vanligen mellan +3°C och +5°C. Vegetationsperiod benämns ibland växtsäsong.


4.7 Vegetationsperiodens starttidpunkt

Observerat 1961-1990




Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Indexet baseras enbart på beräkningar med temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. Indexet ger tillsammans med vegetationsperiodens längd en uppfattning om framtida förhållanden för sådd och skördetidpunkter.

Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Dagnummer




RCP4.5


RCP8.5



SMHI



SMHI




Vegetationsperiodens start definieras här som första tillfället på året när dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C under 4 dagar i följd. Vegetationsperiodens start räknas då från den första av dessa fyra dagar. Starttiden kan variera en del från år till år, beroende på om vintern varit lång och kall eller om mildluft tidigt förs in. Under referensperioden 1961-1990 hamnar medelvärde för starttiden för vegetationen på dagnummer 104, vilket motsvarar mitten av april. Under 90-talet och 2000-talet tidigare lades vegetationsperiodens start allmänt med någon dag. Trenden håller i sig under resten utav århundradet. I slutet av seklet har starttidpunkten tidigare lagts med ca 3 veckor enligt RCP4.5 medan RCP8.5 visar på att vegetationsperioden kan börja upp mot 1,5 månad tidigare jämfört med perioden 1961-1990. Runt Vättern innebär det att vegetationsperioden kan börja redan i början av februari, på Höglandet i mitten av mars.

Analyserna av vegetationsperiodens start och längd visar att vegetationsperiodens slut förändras ungefär lika mycket som starttidpunkten för RCP4.5 medan RCP8.5 visar på den största ökningen i början av året. I slutet av seklet senareläggs sluttidpunkten med ca 1 månad enligt både RCP4.5 och RCP 8.5. För RCP8.5 beräknas vegetationsperioden bli så lång att när den väl har startat i början av året kan den vara året ut.


4.8 Värmebölja

Observerat 1961-1990




Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner. Här definieras värmebölja som årets längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20°C. Indexet belyser behovet av anpassning till perioder med höga temperaturer för t.ex. byggnader och vård- och omsorgssektorn.


Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Antal dagar



RCP4.5

RCP8.5






Under perioden 1961-1990 var det bara ett fåtal tillfällen varje år som dygnsmedeltemperaturen kom över 20°C, detta skedde runt Vättern och i södra delen av länet, på höglandet var det ganska sällsynt med så varma dagar. Medelvärde för länet som helhet var 2,2 dagar. Det har under de senaste drygt 20 åren blivit något varmare men antalet sammanhängande dagar med medeltemperaturer över 20°C har bara ökat med ca 1-3 dagar per år i länet. Under de kommande åren visar beräkningarna på längre perioder med dygnsmedeltemperaturer över 20°C. Skillnaden är störst för RCP8.5, i vilket värmeböljornas längd har ökat med 6 gånger i slutet av seklet. Den största ökningen blir runt Vättern och länets östra delar där det i genomsnitt beräknas bli upp till två veckor i följd med värmebölja. Maximikurvorna visar däremot att det vissa år i slutet av seklet kan handla om uppemot 2 månader i följd med värmebölja. Ökningen är inte fullt lika stor i RCP4.5, på höglandet rör det sig om några få dagar i följd med varma dagar och runt Vättern samt i länets östra delar håller värmeböljan i sig i genomsnitt under en dryg veckas tid.


4.9 Graddagar för uppvärmning

Observerat 1961-1990




Graddagar för uppvärmning är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 17°C, summerat på ett år. En dygnsmedeltemperatur på 12°C bidrar exempelvis med 5 grader till årssumman. Dygnsmedeltemperaturer över 17°C ger inget bidrag. Graddagar för uppvärmning är ett energimått och används för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder.

Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Graddagar




RCP4.5


RCP8.5



SMHI



SMHI




Behovet av uppvärmning minskar. För referensperioden 1961-1990 var antalet graddagar 4198 i genomsnitt för länet. Temperaturgradienten över länet syns i kartorna som större antal graddagar på höglandet jämfört med övriga delar av länet. Under de senaste årtiondena har uppvärmningsbehovet minskat i medeltal, vilket framgår både av kartor och av diagram. Den utvecklingen ser ut att fortsätta och om 25 år är enligt beräkningarna antalet graddagar för länet ca 3500. RCP4.5 visar på ca 3300 graddagar för länet vid seklets slut, med en variationsbredd på 3100-3800 graddagar. RCP8.5 anger en minskning ned mot 2800 graddagar, med variationsbredd 2400-3100 graddagar.


4.10 Graddagar för kylning

Observerat 1961-1990

Graddagar för kylning är summan av hela årets dygnsmedeltemperaturer över 20°C. En dygnsmedeltemperatur på 22°C bidrar exempelvis med 2 grader till årssumman. Graddagar för kylning är ett energimått och används för att uppskatta behovet av kylning i bostäder.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Graddagar




RCP4.5


RCP8.5



SMHI



SMHI



Behoven av kylning har hittills varit små i Sverige. För Jönköpings län var medeltalet för referensperioden 1961-1990 4 graddagar, enligt den definition som här används. Kylbehovet ökar med ökande sommartemperaturer och RCP8.5 visar en markant ökning mot slutet av seklet till i medeltal 100 graddagar men skillnaderna kan vara stora i länet. Runt Vättern och i länets östra delar blir det drygt 100 graddagar medan det på höglandet rör sig om ca 60 graddagar.


Behovet av energi för kylning förblir dock mycket litet i jämförelse med uppvärmningsbehovet, även i framtiden.

5 Nederbörd


5.1 Årsmedelnederbörd

Observerat 1961-1990


Årsmedelnederbörd är medelvärdet av varje års summerade dygnsnederbörd. Det är tillsammans med årsmedeltemperatur det mest använda klimatindexet för att beskriva klimatet.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098







Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Årsmedelnederbörden i Jönköpings län var under perioden 1961-1990 741 mm. Det regnar och snöar mest i den västra delen av länet, eftersom våra vädersystem vanligen kommer västerifrån och tvingas stiga upp över höglandet. Diagrammet visar att mellanårsvariationen är stor (mellan 590 mm och 960 mm). Under de senaste 23 åren har en del blöta år förekommit, främst i länets sydvästra del. Båda RCP-scenarierna visar på en ökning av nederbörden jämfört med referensperioden. Ökningen är störst i RCP8.5, ca 20 % till slutet av seklet, medan RCP4.5 har en ökning på drygt 10 %. Förändringskartorna visar att ökningen är störst i västra delen av länet.


5.2 Medelnederbörd vinter

Observerat 1961-1990


Vinter definieras här som perioden december-februari. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Nederbörd (mm)






RCP4.5

RCP8.5



Förändring (%)

Förändring
2069-2098 vs 1961-1990


RCP4.5**RCP8.5**

Vinternederbörden i Jönköpings län faller både som regn och snö och de största mängderna faller väster om höglandet. Årsmedelvärdet i smält form var under perioden 1961-1990 160 mm. Öster om höglandet blir det generellt lite mindre nederbörd. Diagrammet visar att mellanårsvariationen är mycket stor (mellan 60 mm och 260 mm). Under de senaste 23 åren har det förekommit en del ovanligt blöta vintrar, jämfört med referensperioden, och då framförallt i länets sydvästra del. Vintern är den årstid som nederbörden väntas öka mest under året. RCP8.5 visar på störst ökning till slutet av seklet, upp mot 40 %. Ökningen är störst i länets västra del och i sydväst kan ökningen vara så stor som 50 %. RCP4.5 visar på ungefär hälften så stor ökning till slutet av seklet. I och med ett varmare klimat kommer nederbörd som regn i stället för snö att bli allt vanligare vintertid.


5.3 Medelnederbörd vår

Observerat 1961-1990

Vår definieras här som perioden mars-maj. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




SMHI




SMHI

Förändring (%)




Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5




SMHI

RCP8.5



SMHI




Vårnederbörden är ganska jämnt fördelad över länet och summeras till 139 mm för perioden 1961-1990, men mellanårsvariationen är stor (mellan 60 mm och 210 mm). I slutet av seklet väntas en ökning av vårnederbörden med dryga 15 % enligt RCP4.5 och ca 30 % enligt RCP8.5.


5.4 Medelnederbörd sommar

Observerat 1961-1990

Sommar definieras här som perioden juni-augusti. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Nederbörd (mm)




RCP4.5


RCP8.5



SMHI




SMHI



Förändring (%)

Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5



RCP8.5




Sommarnederbörden är i medeltal 211 mm för referensperioden 1961-1990. Mellanårsvariationen kan vara ganska stora (mellan 80 mm och 400 mm). Under 2000-talet har det förekommit en del ovanligt blöta år, jämfört med referensperioden. Detta syns både i diagram och karta. Enligt klimatscenarierna sker en svag ökning av sommarnederbörden jämfört med referensperioden fram till slutet av seklet på runt 10 %. Ökningen är något större i RCP8.5, men de två scenarierna är mycket lika.


5.5 Medelnederbörd höst

Observerat 1961-1990

Höst definieras här som perioden september-november. Kartorna visar medelvärdet av varje periods summerade dygnsnederbörd.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Nederbörd (mm)




RCP4.5

RCP8.5




SMHI




SMHI

Förändring (%)




Förändring
2069-2098 vs 1961-1990

RCP4.5




SMHI

RCP8.5



SMHI




Hösten är årstiden med störst nederbördsmängder i Jönköpings län, genomsnitt 220 mm under perioden 1961-1990. Mellanårsvariationen är stor (mellan 130 mm och 300 mm). Till mitten av seklet ger de båda RCP-scenarierna mycket lika resultat, en ökning på knappt 10 % väntas. RCP 4.5 visar liten förändring till slutet av seklet, medan RCP8.5 visar en ökning på ca 20 %. Störst ökning sker i västra delarna av länet.


5.6 Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd

Observerat 1961-1990

Kartorna visar medelvärdet av varje års totala antal dagar då nederbörden överstiger 10 mm. Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Antal dagar




RCP4.5


RCP8.5



SMHI




SMHI





**Förändring
2069-2098 vs 1961-1990**

RCP4.5



RCP8.5




Under referensperioden 1961-1990 uppmättes mer än 10 mm nederbörd på ett dygn i genomsnitt 16 gånger på ett år. Under de senaste 23 år har det förekommit flera blöta år jämfört med referensperioden, vilket framgår tydligt av både diagram och karta. Enligt klimatscenerierna väntas tillfällena bli fler, jämfört med referensperioden. Enligt RCP4.5 ökar antalet dagar med ca 5 och enligt RCP8.5 med ca 8. Ökningen är störst i sydvästra delen av länet där det kan röra sig om en ökning på upp till 11 dagar.


5.7 Maximal dygnsnederbörd

Observerat 1961-1990


Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd. Resultaten presenteras som medelvärden över angiven period. Indexet är ett mått på risken för skyfall.




Observerat 1961-1990




Observerat 1991-2013




Beräknat 2021-2050



Beräknat 2069-2098






Nederbörd (mm)



RCP4.5

RCP8.5






Det geografiska medelvärde av årets största dygnsnederbörd för perioden 1961-1990 är 28 mm, men enligt diagrammet varierar mängden mycket från år till år. Ett enskilt regn kan ge betydligt större regnmängder. Scenarierna visar på en tydlig ökning av dygnsnederbörden jämfört med referensperioden, både RCP4.5 och RCP8.5 visar på en nära 20 % ökning till slutet av seklet.

Den geografiska förekomsten av maximal dygnsnederbörd är oregelbunden, vilket betyder att ett kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst i länet. I diagrammet framgår tydligt att det förekom några blöta år i början av 2000-talet. Detta syns även i kartan för 1991-2013 och nederbördsökningen är större än vad framtidsberäkningarna visar. Perioden kan alltså betraktas som ovanligt blöt.


5.8 Maximal 7-dygnsnederbörd

Observerat 1961-1990

Indexet är ett mått på årets största 7-dygnsnederbörd. Resultaten presenteras som medelvärden över angiven period. Indexet kan till exempel användas för bedömning av förändringar i vattenflöde i små och medelstora naturvattendrag och diken.




Observerat 1961-1990




SMHI

Observerat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Nederbörd (mm)




RCP4.5


RCP8.5



SMHI



SMHI




Det geografiska medelvärde av årets största 7-dygnsnederbörd för perioden 1961-1990 är 64 mm, men som diagrammet visar varierar mängden mycket från år till år (mellan 45 mm och 115 mm). Perioden 1991-2013 visar på ovanligt blöta förhållanden även med detta index. Scenarierna visar på en ökning av 7-dygnsnederbörden, RCP8.5 ger en ökning på ca 20 % till slutet av seklet jämfört med referensperioden och RCP4.5 visar på ca 15 %. Enligt båda scenarierna väntas de största mängderna i länets sydvästra del. Spridningen på beräkningarna är däremot stora och ovanligt stora 7-dygnsnederbörd kan inte uteslutas i framtida klimat.

5.9 Förändring av korttidsnederbörd

I föregående avsnitt har nederbörd analyserats utifrån dygnsvärden, både på års-, säsongs- och dygnsbasis. SMHI har även gjort studier av hur intensiv nederbörd kan förändras i framtiden.

Som underlag till Dricksvattenutredningen publicerades en rapport som bland annat innehåller kartor på Sverigeskala över så kallad framtida extrem korttidsnederbörd (Eklund m.fl., 2015). Baserat på den studien har nedanstående diagram framtagits för Jönköpings län över extrem nederbörd med 1-timmes varaktighet (figur 4). Diagrammen beskriver den procentuella ökningen av 1-timmesnederbörd för perioden 2069-2098 jämfört med referensperioden 1961-1990.

Resultatet presenteras för olika återkomsttider, ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Se ytterligare förklaring i Ordlistan.




Figur 4. Procentuell förändring av nederbörd med varaktigheten 1 timme mellan perioderna 2069-2098 och 1961-1990 för Jönköpings län. Punkterna representerar medianvärden och vertikala streck visar spridningen mellan de olika modellberäkningarna.

Den extrema 1-timmesnederbörden förväntas öka, och RCP8.5 visar på större förändring än RCP4.5. Ökningen är något större för de längre återkomsttiderna, dvs. de mer ovanliga extrema skurarna. Dock visar beräkningarna även på 15-25 % ökning för de årligen återkommande skurarna.

6 Total medeltillrinning

Avsnittet behandlar den totala tillrinningen dvs. det ackumulerade flödesbidraget från alla avrinningsområden som ligger uppströms, även utanför länsgränsen. Indexen kan vara av intresse för att bedöma vattentillgång till kraftproduktion och vattenuttag, samt för planering av markanvändning, som exploatering i områden kring sjöar och vattendrag. I Figur 5 är de utvalda vattendragen för analys av total tillrinning markerade med punkter. Gula områden används för analyser av lokal tillrinning, vilka redovisas i avsnitt 7.



Figur 5. Kartan visar avrinningsområden (röda linjer) och delområden enligt HBV-modellen (ljusgrå linjer). De markerade vattendragspunkterna relaterar till diagrammen över total tillrinning i rapporten. De gulmarkerade områdena avser beräkningarna för lokal tillrinning och markfuktighet. Jönköpings län markeras med mörkgrå linje.

6.1 Förändrad total medeltillrinning för år och säsonger

I diagrammen på följande sidor redovisas beräkningar av framtidens hydrologiska förhållanden avseende total tillrinning.

Framtidsberäkningarna av den totala årsmedeltillrinningen visar en ökning för RCP4.5 med ca 5 % förutom för Svartån och Emån där tillrinningen är oförändrad på årsbasis. RCP8.5 visar på en ökning med 5-10% förutom för Svartån som är oförändrad och Emån som har en minskning av tillrinningen.

Den största förändringen av totala tillrinningen sker för vinterperioden på grund av mer nederbörd och mildrare vintrar. Mot mitten av seklet ses en generell ökning över länet men med variationer. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet. Av diagrammen framgår att RCP8.5 ger ökning av tillrinningen med 25-55 %. Även RCP4.5 ger ökning för samtliga vattendrag med 15-35 %.


En minskning av tillrinningen kan ses i slutet av seklet för Emån, Lagan, Storån och Nissan under våren. Minskningen beror till största delen på att vinternederbörd i större utsträckning faller som regn och att mindre vatten därmed magasineras som snö till vårperioden.

Under sommarmånaderna är minskningen i total tillrinning stor. Scenariot RCP4.5 visar på en minskning med 5-20 % och RCP8.5 på en minskning med 10-30%. Orsaken till minskningen är att avdunstningen ökar mycket i det varmare klimatet.


För höst minskar tillrinningen för Svartån, Emån och Lagan övriga vattendrag uppvisar oförändrade tillrinningar.

Förändrad total årsmedeltillrinning


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidöstern



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




Förändrad total medeltillrinning vinter


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidösteren



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




Förändrad total medeltillrinning vår


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidösteren



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




Förändrad total medeltillrinning sommar


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidösteren



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




Förändrad total medeltillrinning höst


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidösteren



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




6.2 Förändrad total 10-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 10 år. Kartor och diagram ger en uppfattning om hur relativt vanliga höglöden kommer att öka eller minska och var det sker. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.




För flöden med återkomsttid 10 år är de beräknade framtida förhållandena i länet lite blandade. Mot slutet av seklet ökar 10-årstillrinning i stora delar av länet. Dock förekommer även områden med minskade 10-årstillrinningar. Kartorna visar på att RCP 8.5 har en större ökning av den totala 10-årstillrinningen än RCP4.5. Diagrammen visar att Tabergså, Svartån, i viss mån Lagan, Storån och Nissan har en ökad 10-årstillrinning. Emån har en något minskad 10-årstillrinning.


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidöstern



Storån Hillerstorp




Nissan nedströms länsgränsen




6.3 Förändrad total 100-årstillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år och kan vara till hjälp vid bedömningar av översvämningsrisker längs sjöar och vattendrag.




Kartorna uppvisar stora likheter med 10-årstillrinningen. Även diagrammen uppvisar samma utveckling som för 10-årstillrinningen med något minskande 100-årstillrinning för Emån och ökning av övriga analyserade vattendrag.


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidöstern



Storån Hillerstorp



Nissan nedströms länsgränsen




7 Lokal medeltillrinning

Avsnittet behandlar den lokala tillrinningen, dvs. flödesbidraget från enbart det aktuella avrinningsområdet (utan bidrag från avrinningsområden som ligger uppströms). Detta ger en bild av hur mindre vattendrag vars vattenföring² enbart beror på lokala förhållanden, påverkas. Indexen kan användas för att se hur klimatförändringar förväntas förändra de lokala flödesmängderna, vilka bland annat påverkar förutsättningarna för liv i vattnet. Indexen kan även användas för att bedöma förändring av potentialen för kraftproduktion i mindre vattendrag.

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Diagram visas i detta avsnitt för endast två delavrinningsområden, Lagan nedströms Sävjaån och Lagan Fryele (se Figur 5).


7.1 Förändrad lokal årsmedeltillrinning

Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning på årsbasis.




² Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag

Lagan nedströms Sävjaån




Lagan Fryele




Kartorna visar att i mitten av seklet är den lokala årsmedeltillrinningen i stora delar av länet oförändrad. I slutet av seklet sker en ökning, främst i de västra delarna av länet. I vissa områden förekommer även en minskning av lokal årsmedeltillrinning. Diagrammen för delavrinningsområdena i Lagan visar på en ökning med ca 5 % i slutet av seklet.

7.2 Förändrad lokal medeltillrinning vinter


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under vintern, här definierad som perioden december-februari.



Lagan nedströms Sävjaån




Lagan Fryele




Den största förändringen av lokala tillrinningen sker liksom för den totala tillrinningen, under vinterperioden på grund av mer nederbörd och mildrare vintrar. Diagrammen visar att Lagan nedströms Sävjaån har en ökning på 40 % för RCP4.5 och 60 % för RCP8.5. Lagan vid Fryele har en ökning på 25 % för RCP4.5 och 40 % för RCP 8.5.

7.3 Förändrad lokal medeltillrinning vår


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under våren, här definierad som perioden mars-maj.



Lagan nedströms Sävjaån




Lagan Fryele




Den lokala tillrinningen under våren minskar för stora delar av länet. Minskningen beror till största delen på att vinternederbörd i större utsträckning faller som regn och att mindre vatten därmed magasinerats som snö till vårperioden. I tillägg till detta ökar också avdunstningen i det varmare klimatet. Lagan visar enligt diagrammen på stadigt minskad tillrinning under våren. Mot seklets slut visar RCP8.5 på minskning med 20 % och RCP4.5 10-15%.

7.4 Förändrad lokal medeltillrinning sommar


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under sommaren, här definierad som perioden juni-augusti.



Lagan nedströms Sävjaån




Lagan Fryele




För sommarperioden visar scenarierna på minskad tillrinning för stora delar av länet. Diagrammen visar på att en minskning med ca 20 % för RCP4.5 och ca 30 % för RCP8.5.

7.5 Förändrad lokal medeltillrinning höst


Kartorna visar den procentuella förändringen jämfört med medelvärdet för referensperioden. Indexet avser 30-årsmedelvärden av tillrinning under hösten, här definierad som perioden september-november.



Lagan nedströms Sävjaån



Lagan Fryele




För höstperioden ses minskad tillrinning i de östra delarna av länet. De analyserade områdena för Lagan visar på en minskning med ca 5-10 %.


7.6 Antal dagar med lågflöde

Beräknat 1961-1990

Antal dagar då tillrinningen är lägre än medellågtillrinningen för perioden 1963-1992. Medellågtillrinning beräknas som medelvärde av varje års lägsta tillrinning under en 30-årsperiod. Indexet är intressant för långtidsplanering av vattentillgångar för dricksvatten och bevattning.




Beräknat 1961-1990




SMHI

Beräknat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Antal Dagar




RCP4.5

RCP8.5




SMHI




SMHI

Lagan nedströms Sävjaån



Lagan Fryele



Kartorna visar på en ökning av antalet dagar med lågvatten, speciellt i de östra delarna av länet på grund av ökande tempertur och således ökad avdunstning. Antal dagar då tillrinningen är låg för Lagan ökar från ca 20 till 30-60 dagar beroende på scenario.

8 Tillrinningens årsdynamik

Tillrinningen varierar mellan år och under året beroende på hur nederbörd, temperatur, snötäcke, markfuktighet och avdunstning varierar och samspelar. För vattendragen ses dock vanligen en återkommande dynamik under året. Förändringar i årstidsförloppen kan ha stor betydelse för vattenförsörjning, miljö och biologisk mångfald, översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion.

I figurerna visas medelvärden för tillrinningens årsdynamik. Svart linje representerar referensperioden 1963-1992 och de två övriga linjerna representerar framtidsperioden 2069-2098. Blå linje avser medelvärden av beräkningar enligt RCP4.5 och röd linje representerar motsvarande för RCP8.5.


Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och att vårflödestopparna har förvunnit i förekommande fall. Det beror på mer nederbörd under vintern och att högre temperaturer gör att nederbörden inte lagras som snö utan rinner av vintertid. Därmed uteblir också vårflödestoppen.

De låga flödena, som under referensperioden inträffar under sommaren uppträder också tidigare. Diagrammen visar även på en längre säsong med lägre flöden vilket kan kopplas till en längre vegetationsperiod. Växterna tar mer vatten och det når då inte vattendragen.


RCP8.5 ger kraftigare förändringar med högre vintertillrinning och lägre sommartillrinning samt längre period med låg tillrinning än vad RCP4.5 ger.

Diagrammen visar medelvärden och därmed framträder de typiska dragen tydligare men variationen mellan år är stor.


Tabergsåns inlopp i Munksjön




Svartån Ralången Aneby Ralången




Svartåns inlopp i Sommen




Emån vid Brusafors




Lagan Fryele




Lagans inlopp i Vidöstern



Storån vid Hillestorp




Nissan nedström länsgränsen




9 Markfuktighet

Beräknat 1961-1990




Antal dagar per år med låg markfuktighet. Indexet baseras på referensperiodens medelvärde av varje års lägsta markfuktighet. Indexet kan ha intresse för långtidsplanering av bevattningsbehov och grödoval samt skogsbrandriskbedömning och skogsvårdsinsatser.

Beräknat 1961-1990




SMHI

Beräknat 1991-2013




SMHI

Beräknat 2021-2050




SMHI

Beräknat 2069-2098




SMHI

Antal dagar




RCP4.5

RCP8.5




SMHI




SMHI

Lagan nedströms Sävjaån



Lagan Fryele



Perioden 1991-2013 har haft fler dagar med låg markfuktighet jämfört med referensperioden. Denna tendens fortsätter under seklet och de två RCP-scenarierna visar relativt stora skillnader vid seklets slut.

Avrinningsområdet Lagan har i dagens klimat ca 15 dagar med låg markfuktighet. Antalet dagar ökar långsamt men efter mitten på seklet sker ökningen snabbare. Vid seklets slut visar RCP4.5 på en fördubbling av antal dagar med låg markfuktighet (ca 30 dagar) och RCP8.5 visar ännu kraftigare ökning till ca 50 dagar.

10 Slutsatser

Hur klimatet i Jönköpings län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen ser ut i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. I rapporten har beräkningar med två olika utvecklingsvägar analyserats fram till seklets slut. Scenariot RCP4.5 beskriver en framtid med kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar, men för scenariot RCP8.5 fortsätter utsläppen att öka.

Årsmedeltemperaturen i Jönköpings län låg under perioden 1961-1990 på knappt 5°C på höglandet men mildare i övrigt, högst runt Vättern med drygt 6°C. Analyserna av framtida klimat visar en gradvis uppvärmning. I mitten på seklet visar båda RCP-scenarierna en uppvärmning på ca 2 grader jämfört med perioden 1961-1990. I slutet av seklet visar RCP4.5 en uppvärmning på ca 3 grader medan RCP8.5 hamnar på knappt 5 grader. Fortsatta utsläppsökningar innebär alltså för Jönköpings län att höglandet får en årsmedeltemperatur på 8-9 grader och runt Vättern kan det bli närmare 11 grader. Alla fyra årstider väntas bli varmare och den största uppvärmningen sker under vintern och sommaren, enligt RCP8.5 med upp till 5 grader för båda årstiderna.

I och med uppvärmningen ökar **vegetationsperiodens** längd, för RCP4.5 med ungefär 1,5 månad och för RCP8.5 ca 80 dagar. **Värmeböljorna** förväntas också öka då antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 13 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet, vilket kan jämföras med drygt 2 dagar under referensperioden.

Antalet graddagar för uppvärmning sjunker, vilket betyder att behovet av uppvärmning minskar. Vid slutet av seklet visar RCP8.5 på ca 2800 och RCP4.5 på ca 3300 graddagar, att jämföra med ca 4300 under referensperioden. Ökande sommartemperaturer leder till ett visst kylbehov, enligt RCP8.5 är det ca 130 graddagar vid seklets slut.

En varmare atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation vilket ger mer nederbörd. Analyserna av **årsmedelnederbörd** bekräftar större regnmängder i det framtida klimatet, jämfört med referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden väntas öka med 10-20 % till seklets slut. Nederbörden ökar mest vintertid, i sydvästra delen av länet visar RCP8.5 på nära 50 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka uppemot 20 %.

För länet ses en ökning av **årstillrinningen** med uppemot 5 % vid slutet av seklet. Den största ökningen av tillrinningen sker för vintern och även det lägre scenariot RCP4.5 visar på 15-35 % för vattendragen. För sommaren ses minskad tillrinning för vattendragen.

Tillrinning med **återkomsttid** 10 år respektive 100 år ser ut att öka i delar av länet. Det förekommer även delar av länet som uppvisar minskningar av de höga tillrinningarna.

Vattendragen har under referensperioden haft tydliga **årstidsförlopp**, med vårflodestopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Dessa förändras enligt framtidsscenarierna som visar på högre vinterflöden och vårflodestopparna har försvunnit. En längre säsong med lägre flöden kan också förväntas. Antalet dagar då tillrinningen är låg ökar från ca 20 dagar till 30-40 dagar (RCP4.5) eller ca 50-60 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Antalet dagar med låg **markfuktighet** ökar i framtiden. Från dagens 15 dagar till 30 dagar (RCP4.5) eller 50 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet.

Beskrivningen baseras på medelförhållanden men det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

11 Tackord

Förutom rapportförfattarna har även Kristoffer Hallberg, Joel Dahné och Johan Andréasson bidragit till rapporten. Tack också till alla som deltog i arbetet med nedskalning av RCP-scenarierna.

12 Referenser

- Andréasson J., Persson G., Sjökvist E., Eklund D., Asp M., Olsson J., Hallberg K. och Johnell A. 2011. Klimatanalys för Jönköpings län. SMHI rapport nr 2011-74.
- Eklund A., Axén-Mårtensson J., Bergström S., Björck E., Dahné J., Lindström L., Nordborg D., Olsson J., Simonsson L. och Sjökvist E. 2015. Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattenutredningen. SMHI Klimatologi Nr 14.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-framtida-klimat-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.89524>
- ICONICS, 2013. Nakićenović N., Lempert R., and Janetos A (eds.). A Special Issue of Climatic Change journal on the Framework for the Development of New Socioeconomic Scenarios for Climate Change Research. <https://www2.cgd.ucar.edu/research/iconics/publications/ssps>
- IPCC 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Nougier, M., van der Linden, P.J. Dai, X., Maskell, K. and Johnsen, C.A. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881 pp. http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
- IPCC 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html
- IPCC 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>
- Nakićenović N., and R. Swart (eds.) 2000. Special Report on Emissions Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 599 pp. <https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf>
- Persson G., Strandberg G. och Berg P. 2015. Vägledning för användande av klimatscenarier. SMHI Klimatologi Nr 11. <http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier>
- Sjökvist E., Axén Mårtensson J., Dahné J., Köplin N., Björck E., Nylén L., Berglöv G., Tengdelius Brunell J., Nordborg D., Hallberg K., Södling J. och Berggreen-Clausen S. 2015. Klimatscenarier för Sverige – Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier. SMHI Klimatologi Nr 15.
<http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/klimatscenarier-for-sverige-bearbetning-av-rcp-scenarier-for-meteorologiska-och-hydrologiska-effektstudier-1.87248>

SMHIs publiceringar

SMHI ger ut sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket.

Seriernas namn	Publiceras sedan
RMK (Report Meteorology and Climatology)	1974
RH (Report Hydrology)	1990
RO (Report Oceanography)	1986
METEOROLOGI	1985
HYDROLOGI	1985
OCEANOGRAFI	1985
KLIMATOLOGI	2009

I serien KLIMATOLOGI har tidigare utgivits:

- | | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | Lotta Andersson, Julie Wilk, Phil Graham, Michele Warburton (University KwaZulu Natal) (2009)
Local Assessment of Vulnerability to Climate Change Impacts on Water Resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for Adaptation | 6 | Jonas Olsson och Kean Foster (2013)
Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige |
| 2 | Gunn Persson, Markku Rummukainen (2010)
Klimatförändringarnas effekter på svenskt miljömålsarbete | 7 | FNs klimatpanel – Sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet. Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2014) |
| 3 | Jonas Olsson, Joel Dahné, Jonas German, Bo Westergren, Mathias von Scherling, Lena Kjellson, Fredrik Ohls, Alf Olsson (2010)
En studie av framtida flödesbelastning på Stockholms huvudavloppssystem | 8 | Att begränsa klimatförändringar (2014) (Ej publicerad) |
| 4 | Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar, Joakim Langner, Ralf Döscher, Henrik Smith (2011)
Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet. En översyn av natur-vetenskapliga aspekter | 9. | Erik Kjellström SMHI. Reino Abrahamsson, Pelle Boberg. Eva Jernbäcker Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel
Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI (2014)
Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget |
| 5 | Sten Bergström (2012)
Framtidens havsnivåer i ett hundraårsperspektiv – kunskapssammanställning 2012 | 10. | Risker och konsekvenser för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt (2014) |
| | | 11. | Gunn Persson (2015)
Vägledning för användande av klimatscenarier |
| | | 12 | Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelus (2015)
Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat |

13. Gunn Persson (2015)
Sveriges klimat 1860-2014. Underlag till Dricksvattenutredningen.
14. Anna Eklund (2015)
Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattensutredningen.
15. Elin Sjökvist, Jenny Axén Mårtensson, Joel Dahné, Nina Köplin, Emil Björck, Linda Nylén, Gitte Berglöv, Johanna Tengdelius Brunell, Daniel Nordborg, Kristoffer Hallberg, Johan Södling, Steve Berggreen-Clausen (2015)
Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier
16. Elin Sjökvist, Gunn Persson, Jenny Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson (2015)
Framtidsklimat i Dalarnas län – enligt RCP-scenarier.
17. Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Värmlands län – enligt RCP-scenarier.
18. Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Örebro län – enligt RCP-scenarier.
19. Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västmanlands län – enligt RCP-scenarier.
20. Elin Sjökvist, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson (2015)
Framtidsklimat i Uppsala län – enligt RCP-scenarier.
21. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier.
22. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Södermanlands län – enligt RCP-scenarier.
23. Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Östergötlands län – enligt RCP-scenarier.
24. Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist (2015)
Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scenarier.



Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

ISSN 1654-2258